HuT-78

300338

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

HuT-78-solulinja on ihmisen T-solulymfooma-linja, joka on peräisin potilaalta, jolla on Sézaryn oireyhtymä, joka on ihon T-solulymfooman (CTCL) leukeeminen muunnos. Näille soluille on ominaista niiden kypsä T-helper-fenotyyppi, joka ilmentää CD4:ää ja josta puuttuvat CD8:n pintamerkit, mikä vastaa niiden alkuperää pahanlaatuisesta T-solupopulaatiosta. HuT-78-solut ovat erityisen merkittäviä T-solubiologian, immuunivasteen ja lymfooman tutkimuksissa, sillä ne tarjoavat tietoa T-soluleukemioiden ja -lymfoomien taustalla olevista molekulaarisista ja solumekanismeista.
HuT-78-soluilla on erilaisia epänormaaleja karyotyyppejä, kuten monimutkaisia kromosomien uudelleenjärjestelyjä ja aneuploidiaa, jotka liittyvät yleisesti niiden pahanlaatuiseen fenotyyppiin. Nämä solut reagoivat mitogeeniseen stimulaatioon, ja niitä voidaan hyödyntää T-solujen aktivoitumista ja signaalireittejä koskevassa tutkimuksessa. Lisäksi HuT-78-solut ovat herkkiä erilaisille kemoterapeuttisille aineille, mikä tekee niistä arvokkaan mallin testattaessa syöpälääkkeitä, erityisesti T-solulymfoomiin kohdistuvia lääkkeitä. Tutkijat käyttävät HuT-78-soluja myös lymfoomasolujen ja immuunijärjestelmän välisten vuorovaikutusten tutkimiseen, mikä antaa paremman käsityksen immuunijärjestelmän kiertomekanismeista.
Tätä solulinjaa viljellään suspensiossa, ja se vaatii erityisiä olosuhteita elinkelpoisuuden ja kasvun ylläpitämiseksi. HuT-78-solut ovat elintärkeitä CTCL:n patogeneesin ymmärtämisessä ja pahanlaatuisiin T-soluihin kohdistuvien mahdollisten hoitostrategioiden kehittämisessä.

Kudos	Veri
Sairaus	Mycosis fungoides ja Sezaryn oireyhtymä

Synonyymit

- Hut 78
- HUT 78
- HuT 78
- HUT-78
- HuT78
- Hut78
- HUT78
- NCI-H78

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Mies
Kasvuominaisuudet	Jousitus
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Pyöreät kennot
Solutyyppi	T-lymfoblasti

TUNNISTEET

Lähdeviite

HuT-78 (Cytionin luettelonumero 300338)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_0337

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Ilmentyvät reseptorit

Interleukiini-2 (interleukiini 2, IL-2)

Proteiinin ilmentyminen

P53 negatiivinen

Antigeenin ilmentyminen

CD4

Tuotteet

Interleukiini-2 (interleukiini 2, IL-2), tuumorinekroositekijä alfa (TNF alfa)

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO_2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 % lämpöinaktivoidulla FBS:llä

Soluviljely

Ylläpidä viljelmiä lisäämällä tai vaihtamalla kasvualusta säännöllisesti. Aloita viljelyt tiheydellä 5 x 10^5 solua/ml ja pidä solupitoisuus välillä 3 x 10^5 – 1 x 10^6 solua/ml optimaalisen kasvun saavuttamiseksi.

Kylvötiheys	1 x 10^5 solua/ml
Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa
Sulamisen jälkeinen palautuminen	Anna solujen toipua pakastuksesta 24-48 tuntia.

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	53 vuotta
Etnisyys	Kaukasialainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes