SK-OV-3

300342

□要

□明

SK-OV-3□胞（別名SKOV3□胞）は、64歳の白人女性卵巣癌患者の腹水から樹立されたもので、卵巣癌の亜型である漿液性嚢胞腺癌の研究に用いられる。 これらの□胞は、腫瘍壊死因子やシスプラチンを含む様々な □胞毒性薬剤に対する耐性で知られており、卵巣癌治療における化学療法の課題を浮き彫りにすると同時に、シスプラチン耐性の基盤となるメカニズムの研究や新たな治療戦略の探索に優れたモデルを提供している。
チオレドキシン抗酸化系（Trx）を含む抗酸化系は、SK-OV-3□胞の生存と耐性に重要な役割を果たしており、化学療法に対する癌□胞の感受性を高める介入の標的となる。ケルセチンなどの化合物を用いて抗酸化系を調節し、 SK-OV-3□胞にアポトーシスを誘導することは、癌治療における食事性抗酸化物質の可能性を示唆している。
薬剤耐性研究における役割に加え、SK-OV-3□胞は卵巣癌□胞の浸潤性行動や、腫瘍微小環境（腫瘍進展における M0/M2マクロファージの役割を含む）との相互作用の解明にも用いられる。 SK-OV-3□胞の癌研究への応用は、異種移植モデルの開発や、腫瘍の成長と転移を in vivoでモニタリングするためのホタルルシフェラーゼ（ firefly-Luc）などのレポーター遺伝子の使用にまで及んでいる。
全体として、SK-OV-3□胞は、耐性を駆動する分子メカニズムやエストロゲンシグナル伝達から、がん □胞と腫瘍微小環境との相互作用に至るまで、卵巣がんの複雑性を理解するための重要なモデルとして機能している。

ティッシュ	卵巣
病気	漿液性嚢胞腺がん
転移部位	腹水

同義語

- SKOV-3
- SK-OV3
- SK.OV.3
- SKOV3
- Skov3
- SKO3

分類

生物	人間
セックス	女性
成長特性	アドヘレント
バイオセーフティレベル	1

特徴

腫瘍形成性	卵巣原発に一致する中等度の高分化腺がんを形成する。

核型

(P16)低倍数体から低倍数体、二中心体と大きなテロセントリックを持つ。

識別子

引用

SK-OV-3 (Cytion カタログ番号 300342)

NCBI 納税者番号	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

セロサウルス	CVCL_0532

発現と感受性

アイソザイム

PGM3ˊ1ˊPGM1ˊ1-2ˊES-Dˊ1ˊMe-2ˊ1ˊAK-1ˊ1ˊGLO-1ˊ1-2ˊG6PDˊB、表現型頻度製品： 0.0311

取り扱いと飼育

培地

DMEM:Ham's F12 (1:1)ˊw: 3.1 g/Lグルコース、w: 2.5 mM L-グルタミン、w: 15 mM HEPESˊw: 0.5 mMピルビン酸ナトリウム、w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion製品番号820400a)

培養雰囲気	37℃ˊ5%CO2、加湿雰囲気。

サプリメント

培地に10% FBSを加える

解離試薬	アキュターゼ

継代培養

接着した□胞から古いメデュームを取り除き、カルシウムとマグネシウ ムを除いたPBSで洗浄する。T25フラスコでは3-5mlˊT75フラスコでは5-10mlのPBSを使用する。次に、T25フラスコでは1-2mlˊT75フラスコでは2.5mlのアキュターゼで□胞を完全に覆う。室温で8-10分間インキュベートし、□胞を剥離させる。インキュベーション後、 □胞を10mlの培地と静かに混合して再懸濁し、 300xgで3分間遠心する。上清を捨て、 □胞を新しいメデュームに懸濁し、新しいメデュームの入った新しいフラスコに移す。

播種密度	1×10^4 □胞/cm^2
解凍後の回復	解凍後、□胞を5×10^4□胞/cm^2で播種し、凍結処理からの回復と接着を少なくとも 24時間以上行う。

解凍と培養

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

品質管理と凍結保存

無菌性

マイコプラズマ汚染は、PCRベースのアッセイと発光ベースのマイコプラズマ検出法の両方を用いて除外される。
□菌、真菌、酵母のコンタミネーションがないことを確認するため、 □胞培養物は毎日目視検査が行われる。

凍結培地	凍結保存培地としては、融解後の生存率を十分に高めるために完全増殖培地（ FBSを含む）＋10%DMSO、または回復を促進し凍結によるストレスを軽減するために最適化された浸透保護剤と代謝安定剤を含む CM-1（Cytionカタログ番号800100）を使用している。

保管条件

長期保存の場合、バイアルを-150～-196℃の気相液体窒素に入れる。80℃での保存は、液体窒素に移す前の短い暫定措置としてのみ許容される。

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

配送条件

凍結保存された□胞株は、輸送中約-78℃を維持するのに十分な保冷剤とともに、有効な断熱包装でドライアイスとともに輸送される。受領後、直ちに容器を検査し、遅滞なくバイアルを適切な保管場所に移してください。

寄付者

ドナーの年齢	64年
民族	白人

法務・安全

安全上の注意事項

将来の融解のためにクライオバイアルを液体窒素に保存する場合、厳格な安全対策を遵守することが必須である。適切な保護手袋と保護衣は不可欠であり、液体窒素タンクへの凍結サンプルの移動中または液体窒素タンクからの凍結サンプルの移動中には、フェイスマスクまたは安全ゴーグルの使用が義務付けられている。これは、凍結試料を取り出す際に、凍結試料が爆発し、鋭利な破片が飛び散って怪我をするリスクを軽減するためである。

保証

サイシオンは、製品の品質と生存率を保証します。
当社では、培養を開始した時点で、当社施設からの出荷後 60日間、□胞が生存可能であることを保証しています。
すべての材料が、分析証明書および／または製品シートに記載された仕様に適合していることを保証します。
詳□については、<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Warranty Statement をご参照ください。

物質移転契約書の締結が必要	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB