T47D

300353

معلومات عامة

الوصف

T47D، نُعد أصبح خط الخلايا الذي نشأ من الانصباب الجنبي لسرطان الثدي القنوي المتسلل من سرطان الثدي القنوي، مورداً هاماً في أبحاث سرطان الثدي. فريدة من نوعها في مجال أبحاث السرطان لملفها التعبيري الهرموني، خاصةً لحملها مستقبلات 17 بيتا استراديول بيتا ومختلف الستيرويدات T-47D خلايا عن الجين الورمي T47D الأخرى والكالسيتونين. بالإضافة إلى ذلك، تعبر خلايا WNT7B.
بعدم تنظيم تعبير مستقبلات هرمون البروجسترون فيها عن طريق الاستراديول، على الرغم من وفرة الهرمون داخل الخلايا، مما يميزها عن T47D تتميز خلايا MCF7، التي تُعرف على نطاق واسع بإيجابية مستقبلات هرمون الاستروجين وتستخدم بشكل متكرر لاستكشاف دور هرمون الاستروجين في تكاثر الورم والاستجابة للعلاجات.
إلى تكوين طعوم زينية في الفئران التي تعاني من نقص المناعة، والتي تعتبر ذات قيمة لاختبار الأدوية، ومراقبة تغيرات حالة T-47D وتمتد فائدة خط خلايا المستقبلات، ودراسة تكوّن الأوعية.
موردًا لدراسات الجينات السرطانية، مما يوفر نظرة ثاقبة للمشهد الجينومي والبروتيني الذي يحفز سرطان الثدي. من T-47D وعلاوة على ذلك، يُعد خط خلايا في تحديد الأنماط الظاهرية الجديدة لخلايا T47d خلال تسهيل فهم أعمق للملامح البروتينية والنسخية لسرطان الثدي، يساعد خط خلايا سرطان الثدي سرطان الثدي وتطوير علاجات مستهدفة.
دورًا أساسيًا في دراسة تأثيرات الهرمونات مثل البروجسترون على سرطان الثدي، مما يوفر رؤى حول تنظيم النسخ ومقاومة الأدوية T47D لعبت خلايا وتطوير نماذج الطعم الوراثي لاختبار العلاجات.

الأنسجة	الثدي
المرض	سرطان الأقنية القنوي الغازي
موقع الانتشار	الانصباب الجنبي

المرادفات

- T-47-D
- T47-D
- T47D:A
- T47D

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	أنثى
خصائص النمو	الملتزم
مستوى السلامة البيولوجية	1

الخصائص

المورفولوجيا	شبيه بالظهارة
مُسبِّب للأورام	نعم، في الفئران العارية

النمط الكروموسومي

النمط = 66، كروموسومات ثنائية المركز وكروموسومات تحت المركز طويلة جداً

المعرّفات

المرجع

T47D (كتالوج سيتيون رقم 300353)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

رقم التعريف الضريبي لدى NCBI	9606
سيلوصور	CVCL_0553

التعبير والقابلية للإصابة

المستقبلات المُعبَّر عنها

استراديول، والستيرويدات، والكالسيتونين، والأندروجين، والبروجسترون، والجلوكوكورتيكويد، والبرولاكتين، والإستروجين

الإيزوزيمات

G6PD، B، PGM1، 1، PGM3، 1، ES-D، 2، Ak-1، 1، GLO-1، 1-2

الجينات المسرطنة

Wnt3 +، Wnt7h +، Wnt7b +، Wnt7b+

الأنماط الطفريّة

طفرة TP53

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

RPMI 1640، 2.0 جم/لتر، ث: 2.0 مللي مولار جلوتامين مستقر، ث NaHCO3 (820700 رقم المادة a من سايتيون)

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

10 ٪ يُضاف إلى الوسط FBS، و10 ميكروغرام/مل من أنسولين HREC

كاشف التفكك	أكوتاس

إعادة الاستنبات

استخدم 3-5 مل من T25، الذي يفتقر إلى الكالسيوم والمغنيسيوم. بالنسبة لقوارير PBS قم بإزالة الوسط القديم من الخلايا الملتصقة واغسلها باستخدام PBS، وبالنسبة لقوارير T75، استخدم 1-2 مل لقوارير T25 و2.5 مل لقوارير T75. ثم، قم بتغطية الخلايا بالكامل باستخدام أكوتاز، باستخدام 5-10 مل. ثم قم بإزالة الخلايا تحتضن في درجة حرارة الغرفة لمدة 8-10 دقائق لفصلها. بعد الحضانة، اخلط الخلايا برفق مع 10 مل من الوسط لإعادة ترسيبها، ثم اطردها مركزيًا بسرعة 300 xg لمدة 3 دقائق. تخلص من المادة الطافية، وأعد غمر الخلايا في وسط جديد وانقلها إلى قوارير جديدة تحتوي بالفعل على وسط جديد.

كثافة البذر	1×10^4 خلية/سم2
تجديد السوائل	إلى 3 مرات في الأسبوع 2
التعافي بعد ذوبان الجليد	بعد الذوبان، ضع الخلايا في طبق بمعدل 5×10^4 خلية/سم2 واترك الخلايا تتعافى من عملية التجميد وتلتصق لمدة 24 ساعة على الأقل.

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

عمر المتبرع	سنة 54
الأصل العرقي	قوقازي

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

في Cytion، نلتزم في Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB