U2OS

300364

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buňky U2OS, buněčná linie osteosarkomu odvozená od lidského pacienta s osteosarkomem, hrají významnou roli ve výzkumu rakoviny, zejména při studiu rakoviny kostí. Buňky U2OS se hojně využívají při výzkumu rakoviny, vývoji léků, studiu apoptózy, genetickém výzkumu a radiační onkologii. Hodnota buněk U2OS spočívá v jejich využití pro zkoumání apoptózy a rezistence k lékům, což je nezbytné pro tvorbu inhibitorů malých molekul a podobných terapeutických látek.
V oblasti klinického výzkumu osteosarkomu má buněčná linie U2OS zásadní význam pro zkoumání biologické odpovědi na radioterapii, čímž obohacuje naše znalosti o biologii osteosarkomu. Tyto buňky jsou také klíčové při zkoumání modifikací chromatinu a jejich vlivu na buněčnou biologii, zejména v souvislosti s tvorbou nádorů a progresí rakoviny.
Buněčná linie U2OS, označovaná také jako buněčná linie OS, je uznávaná pro svou schopnost tvorby nádorů in vivo při podávání subkutánních a intramuskulárních injekcí. Nádory vytvořené buňkami U2OS jsou charakterizovány jako sarkomy vysokého stupně a vykazují významnou produkci osteoidu, který je charakteristickým znakem osteosarkomu. Tyto nádory navíc vykazovaly infiltraci imunitními buňkami. U2OS proto slouží jako reprezentativní model pro studium lidského osteosarkomu, jeho interakcí s lidským imunitním systémem a nádorové imunologie. Jednou z výzev je však zajistit, aby buněčná linie U2OS pro osteosarkom přesně odrážela nádory in vivo, vzhledem k variabilitě ve schopnosti tvorby nádorů.
Závěrem lze říci, že buněčné linie sarkomů, jako je U2OS, slouží jako klíčový nástroj pro pochopení osteosarkomu a nabízejí cenné poznatky o biologii nádorů, vývoji léčby a složitosti interakcí mezi nádorem a imunitním systémem, přičemž zdůrazňují potřebu přesného modelování nádorů in vivo.

Tkáň	Kost, holenní kost
Nemoc	Osteosarkom

Synonyma

- U-2 OS
- U-2OS
- U-2-OS
- U2-OS
- U20-S
- U20S
- 2T

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Žena
Růstové vlastnosti	Přívrženec
Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Epitelu podobné

Karyotyp

(P11-46) hypodiploidní až téměř tetraploidní, (P111-118) modální čísla 34 až 37 a 64 až 67 s abnormalitami včetně dicentrik, zlomů, kroužků a pulverizací a akrocentrických subtelocentrických a minutových markerů

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKÁTORY

Citace

U2OS (katalogové číslo Cytion 300364)

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0042

EXPRESE A NÁCHYLNOST

Exprimované receptory

Růstový faktor podobný inzulínu I (IGF-I), růstový faktor podobný inzulínu II (IGF-I), růstový faktor odvozený od osteosarkomu (ODGF)

Exprese antigenu

Krevní skupina A, Rh+, HLA A2, Aw30, B12, Bw35, B40(+/-)

Isoenzymy

PGM3, 1, PGM1, 2, ES-D, 1, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B, Fenotyp Frekvence produktu: 0.0082

Produkty

Růstový faktor odvozený od osteosarkomu (ODGF)

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/l glukózy, w: 2,5 mM L-Glutaminu, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM pyruvátu sodného, w: 1,2 g/l NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820400a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 10% FBS

Disociační činidlo	Accutase

Subkultivace

Odstraňte staré médium z adherovaných buněk a promyjte je PBS bez vápníku a hořčíku. Pro baňky T25 použijte 3-5 ml PBS a pro baňky T75 5-10 ml. Poté buňky zcela zakryjte přípravkem Accutase, přičemž použijte 1-2 ml pro baňky T25 a 2,5 ml pro baňky T75. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 8-10 minut, aby se oddělily. Po inkubaci jemně promíchejte buňky s 10 ml média, aby byly znovu suspendovány, a poté je odstřeďte při 300xg po dobu 3 minut. Supernatant vyhoďte, buňky znovu rozpusťte v čerstvém médiu a přeneste je do nových baněk, které již obsahují čerstvé médium.

Hustota výsevu	1 x 10^4 buněk/cm^2
Obnova tekutin	2 až 3krát týdně

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	15 let
Etnická příslušnost	Kavkazský

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes