Jiyoye

300366

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

Jiyoye-cellelinjen er en omfattende studert modell avledet fra et humant Burkitt-lymfom. Burkitt-lymfom er en type non-Hodgkin-lymfom som hovedsakelig rammer B-celler, og Jiyoye-cellelinjen beholder mange av de viktigste kjennetegnene ved denne maligniteten. Cellene har den typiske kromosomale translokasjonen mellom c-MYC-genet og immunoglobulingenet, som er et kjennetegn ved Burkitt-lymfom. Denne translokasjonen fører til overuttrykk av c-MYC-onkogenet, noe som driver tumorcellenes proliferative og aggressive natur. Jiyoye-cellelinjen er derfor et uvurderlig verktøy for å studere de molekylære og genetiske mekanismene som ligger til grunn for lymfomagenese, spesielt i forbindelse med MYC-drevet kreft.
Jiyoye-celler vokser i suspensjon og kjennetegnes av høy proliferasjonshastighet, noe som gjør dem egnet for en rekke eksperimentelle anvendelser, inkludert screening av legemidler, genekspresjonsstudier og apoptoseanalyser. Cellelinjen brukes også ofte i forskning som fokuserer på Epstein-Barr-virus (EBV), ettersom Burkitt-lymfomceller, inkludert Jiyoye, ofte huser dette viruset, som er involvert i sykdommens patogenese. Dette gjør Jiyoye spesielt nyttig for å undersøke samspillet mellom virale onkogener og cellulære signalveier i maligne B-celler.
På grunn av sin opprinnelse og sine egenskaper er Jiyoye-cellelinjen en viktig modell for onkologisk forskning, særlig når det gjelder å forstå patofysiologien til B-celle-lymfomer.

Vev	Lymfesystemet
Sykdom	B-celle non-Hodgkin-lymfom
Metastaseområde	B-Lymfocytt

Søknader

Analyse av B-celleoverflateantigener, testing av cytotoksiske legemidler, mutasjonsanalyse, analyse av apoptotiske mekanismer, haplotypestandard.

Synonymer

- JIYOYE
- Jijoye
- JIJOYE
- P-2003
- P3 (Jiyoye)
- P-3-Jijoye
- P3-Jiyoye
- P-3J
- P3J
- Jiyoye(P-2003)
- Jiyoye (P-2003)
- JiyoyeP-2003
- OB2
- GM04678

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Oppheng

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Celletype	B-lymfocytt

Karyotype

46, hypodiploid

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

Jiyoye (Cytion-katalognummer 300366)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1317

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Antigenuttrykk

CD10+, CD19+

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820700a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS

Subkultivering

Opprettholde kulturene ved å tilsette eller skifte ut mediet med jevne mellomrom. Start kulturene med en tetthet på 5 x 10^5 celler/ml og hold cellekonsentrasjonen innenfor området 3 x 10^5 til 1 x 10^6 celler/ml for optimal vekst.

Såtetthet	3 x 10^5 celler/ml
Væskefornyelse	2 til 3 ganger per uke
Gjenoppretting etter tining	Rask (48 timer)

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	7 år
Etnisitet	Afrikansk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes