EB3

300373

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buněčná linie EB3 je model lidského Burkitova lymfomu, který byl původně odvozen od malého dítěte s nádorem horní čelisti v Ugandě. Jedná se o jednu z několika zavedených buněčných linií Burkittova lymfomu, které byly vytvořeny během raných výzkumů imunologických a biologických charakteristik této malignity. Pozoruhodné je, že buňky EB3 vykazují silnou membránovou imunofluorescenční reaktivitu při zkoumání se sérem pacientů s Burkittovým lymfomem v remisi po chemoterapii, což naznačuje přítomnost antigenů spojených s nádorem na jejich povrchu. Tato reaktivita je pravděpodobně zprostředkována protilátkami třídy IgG, jak bylo prokázáno pomocí fluoresceinem konjugovaných anti-IgG činidel. Bylo zjištěno, že EB3 silně reaguje spolu s dalšími Burkittovými liniemi, jako jsou Jijoye, B35M a SL1, zatímco některé další Burkittovy linie, jako například Raji, za stejných podmínek podobnou reaktivitu nevykazovaly.
Buňky EB3 patřily k těm, které byly použity v prvních srovnávacích studiích k rozlišení mezi nádorově specifickými a izoantigenními reakcemi u Burkittovy lymfomové linie. Tato šetření prokázala, že séra některých pacientů - zejména těch v kompletní remisi - mohou selektivně rozpoznávat buňky Burkittova lymfomu oproti normální kostní dřeni nebo lymfocytům od stejného dárce, což svědčí o nádorově specifických imunogenních markerech. Buňky EB3 navíc vykazovaly morfologické a imunofenotypové znaky odpovídající velkým lymfoblastům podobným buňkám Burkittova lymfomu, které mají tendenci vykazovat jasné granulární barvení membrány, pokud jsou vystaveny reaktivnímu séru. Toto historické imunologické profilování EB3 pomohlo vytvořit základ pro pozdější studie zkoumající nádorově specifické antigeny u lymfoidních malignit.

Tkáň	Kost
Nemoc	Burkittův lymfom
Místo metastázy	Kost

Aplikace

3D buněčné kultury, Imunologie

Synonyma

- EB-3
- Epstein-Barr-3
- GM04679

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Muž
Růstové vlastnosti	Odpružení
Úroveň biologické bezpečnosti	2

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Lymfoblasty
Typ buňky	B lymfocyty

IDENTIFIKÁTORY

Citace

EB3 (katalogové číslo Cytion 300373)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1185

EXPRESE A NÁCHYLNOST

Povrchové antigeny

HLA A3, Aw32, Cw2

Isoenzymy

G6PD, A

Viry

EBV (EBNA pozitivní)

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilní glutamin, w: 2,0 g/l $NaHCO_3$ (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO_2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 10 % tepelně inaktivovaného FBS

Subkultivace

Jemně homogenizujte buněčnou suspenzi v baňce pipetováním nahoru a dolů, poté odeberte reprezentativní vzorek pro stanovení buněčné hustoty na ml. Suspenzi zřeďte čerstvým kultivačním médiem tak, aby koncentrace buněk byla 1 x 10^5 buněk/ml, a upravenou suspenzi rozdělte do nových baňek pro další kultivaci.

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	3 roky
Etnická příslušnost	Africké

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB