EB3

300373

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

EB3-cellelinjen er en human Burkitt-lymfom-model, som oprindeligt stammer fra et lille barn med en svulst i overkæben i Uganda. Det er en af flere etablerede Burkitt-lymfomcellelinjer, der blev skabt under tidlige undersøgelser af de immunologiske og biologiske egenskaber ved denne malignitet. Især udtrykker EB3-celler stærk membranimmunofluorescensreaktivitet, når de undersøges med serum fra Burkitt-lymfompatienter i remission efter kemoterapi, hvilket tyder på tilstedeværelsen af tumorassocierede antigener på deres overflade. Denne reaktivitet er sandsynligvis medieret af IgG-klasse antistoffer, som vist ved hjælp af fluorescein-konjugerede anti-IgG-reagenser. EB3 viste sig at reagere kraftigt sammen med andre Burkitt-linjer som Jijoye, B35M og SL1, mens visse andre Burkitt-linjer, som Raji, ikke viste lignende reaktivitet under de samme forhold.
EB3-celler var blandt dem, der blev brugt i tidlige sammenlignende undersøgelser for at skelne mellem tumorspecifikke og isoantigene reaktioner i Burkitt-lymfom. Disse undersøgelser viste, at sera fra nogle patienter - især dem i fuldstændig remission - selektivt kunne genkende Burkitt-lymfomceller frem for normal knoglemarv eller lymfocytter fra samme donor, hvilket indikerer tumorspecifikke immunogene markører. Derudover udviste EB3-celler morfologiske og immunfænotypiske træk, der stemmer overens med store lymfoblastlignende Burkitt-lymfomceller, som har tendens til at udvise lys granulær membranfarvning, når de udsættes for reaktivt serum. Denne historiske immunologiske profilering af EB3 var med til at skabe grundlaget for senere undersøgelser af tumorspecifikke antigener i lymfoide maligniteter.

Væv	Knogle
Sygdom	Burkitt-lymfom
Metastasested	Knogle

Anvendelser

3D-cellekultur, Immunologi

Synonymer

- EB-3
- Epstein-Barr-3
- GM04679

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Mand
Vækstegenskaber	Affjedring
Biosikkerhedsniveau	2

EGENSKABER

Morfologi	Lymfoblast
Celletype	B-lymfocyt

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

EB3 (Cytion katalognummer 300373)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1185

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Overfladeantigener

HLA A3, Aw32, Cw2

Isoenzymer

G6PD, A

Vira

EBV (EBNA pos)

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10 % varmeinaktiveret FBS

Oddyrkning

Homogeniser forsigtigt cellesuspensionen i kolben ved at pipettere op og ned, og tag derefter en repræsentativ prøve for at bestemme celletætheden pr. ml. Fortynd suspensionen til en cellekoncentration på 1 x 10^5 celler/ml med frisk dyrkningsmedium, og fordel den justerede suspension i nye kolber til videre dyrkning.

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	3 år
Etnisk tilhørsforhold	Afrikansk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes