EB3

300373

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

La lignée cellulaire EB3 est un modèle de lymphome de Burkitt humain dérivé à l'origine d'un jeune enfant atteint d'une tumeur maxillaire en Ouganda. Il s'agit de l'une des nombreuses lignées cellulaires de lymphome de Burkitt créées au cours des premières recherches sur les caractéristiques immunologiques et biologiques de cette tumeur maligne. Notamment, les cellules EB3 expriment une forte réactivité d'immunofluorescence membranaire lorsqu'elles sont sondées avec du sérum de patients atteints de lymphome de Burkitt en rémission après une chimiothérapie, ce qui suggère la présence d'antigènes associés à la tumeur à leur surface. Cette réactivité est probablement médiée par des anticorps de classe IgG, comme le montrent les réactifs anti-IgG conjugués à la fluorescéine. On a constaté que les cellules EB3 réagissaient fortement avec d'autres lignées dérivées de Burkitt, telles que Jijoye, B35M et SL1, alors que certaines autres lignées de Burkitt, comme Raji, ne présentaient pas de réactivité similaire dans les mêmes conditions.
Les cellules EB3 ont été parmi celles utilisées dans les premières études comparatives pour distinguer les réponses spécifiques à la tumeur et les réponses isoantigéniques dans le lymphome de Burkitt. Ces études ont démontré que les sérums de certains patients - en particulier ceux en rémission complète - pouvaient reconnaître sélectivement les cellules du lymphome de Burkitt par rapport à la moelle osseuse normale ou aux lymphocytes du même donneur, ce qui indique l'existence de marqueurs immunogènes spécifiques de la tumeur. En outre, les cellules EB3 présentaient des caractéristiques morphologiques et immunophénotypiques compatibles avec les grandes cellules de lymphome de Burkitt de type lymphoblaste, qui ont tendance à présenter une coloration granulaire brillante de la membrane lorsqu'elles sont exposées à un sérum réactif. Ce profilage immunologique historique des cellules EB3 a permis de jeter les bases d'études ultérieures portant sur les antigènes spécifiques des tumeurs dans les tumeurs malignes lymphoïdes.

Tissu	Os
Maladie	Lymphome de Burkitt
Site métastatique	Os

Applications

culture cellulaire 3D, Immunologie

Synonymes

- EB-3
- Epstein-Barr-3
- GM04679

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Homme
Propriétés de croissance	Suspension
Niveau de biosécurité	2

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	Lymphoblaste
Type de cellule	Lymphocyte B

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIANTS

Référence

EB3 (numéro de catalogue Cytion 300373)

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1185

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Antigènes de surface

HLA A3, Aw32, Cw2

Isoenzymes

G6PD, A

Virus

EBV (EBNA pos)

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

RPMI 1640, w : 2.0 mM Glutamine stable, w : 2.0 g/L NaHCO3 (numéro d'article Cytion 820700a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10 % de FBS inactivé à la chaleur

Repiquage

Homogénéisez délicatement la suspension cellulaire dans le flacon en pipettant de haut en bas, puis prélevez un échantillon représentatif afin de déterminer la densité cellulaire par ml. Diluez la suspension afin d'obtenir une concentration cellulaire de 1 x 10^5 cellules/ml avec un milieu de culture frais, puis répartissez la suspension ajustée dans de nouveaux flacons pour poursuivre la culture.

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	3 ans
Origine ethnique	Africains

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes