EB3

300373

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

Celična linija EB3 je model človeškega Burkittovega limfoma, ki je bil prvotno pridobljen pri majhnem otroku s tumorjem čeljusti v Ugandi. Je ena od več uveljavljenih celičnih linij Burkittovega limfoma, ustvarjenih med zgodnjimi raziskavami imunoloških in bioloških značilnosti te maligne bolezni. Celice EB3 izražajo močno membransko imunofluorescenčno reaktivnost, ko jih sondiramo s serumom bolnikov z Burkittovim limfomom v remisiji po kemoterapiji, kar kaže na prisotnost s tumorjem povezanih antigenov na njihovi površini. To reaktivnost verjetno posredujejo protitelesa razreda IgG, kot je razvidno iz uporabe s fluoresceinom konjugiranih anti-IgG reagentov. Ugotovljeno je bilo, da EB3 močno reagira skupaj z drugimi linijami Burkitta, kot so Jijoye, B35M in SL1, medtem ko nekatere druge linije Burkitta, kot je Raji, pod enakimi pogoji niso pokazale podobne reaktivnosti.
Celice EB3 so bile med tistimi, ki so bile uporabljene v prvih primerjalnih študijah za razlikovanje med tumorsko specifičnimi in izoantigenskimi odzivi pri limfomu Burkitt. Te preiskave so pokazale, da lahko serumi nekaterih bolnikov - zlasti tistih v popolni remisiji - selektivno prepoznajo celice limfoma Burkitt v primerjavi z normalnim kostnim mozgom ali limfociti istega darovalca, kar kaže na tumorsko specifične imunogene označevalce. Poleg tega so celice EB3 kazale morfološke in imunofenotipske značilnosti, skladne z velikimi limfoblastom podobnimi celicami Burkittovega limfoma, ki se ob izpostavljenosti reaktivnemu serumu običajno obarvajo s svetlo granularno membrano. To zgodovinsko imunološko profiliranje EB3 je pomagalo vzpostaviti temelje za poznejše študije, ki so preučevale tumorsko specifične antigene pri limfoidnih malignomih.

Tkivo	Kosti
Bolezen	Burkittov limfom
Mesto metastaze	Kosti

Uporaba

3D celična kultura, imunologija

Sinonimi

- EB-3
- Epstein-Barr-3
- GM04679

RAZVRSTITEV

Organizem	Človek
Seks	Moški
Lastnosti rasti	Vzmetenje
Stopnja biološke varnosti	2

ZNAČILNOSTI

Morfologija	Limfoblast
Vrsta celice	Limfocit B

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

EB3 (kataloška številka Cytion 300373)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Davčna identifikacijska številka NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1185

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Površinski antigeni

HLA A3, Aw32, Cw2

Izoenzimi

G6PD, A

Virusi

EBV (EBNA pozitiven)

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnega glutamina, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (številka izdelka Cytion 820700a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO_2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % toplotno aktiviranega FBS

Preusmeritev v drugo kulturo

Nežno homogenizirajte celično suspenzijo v kolbi s pipetiranjem navzgor in navzdol, nato odvzemite reprezentativni vzorec za določitev gostote celic na ml. Suspenzijo razredčite, da dosežete koncentracijo celic 1 x 10^5 celic/ml s svežim kultiviranim medijem, in prilagojeno suspenzijo razdelite v nove kolbe za nadaljnje gojenje.

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence. Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	3 leta
Etnična pripadnost	Afriški

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Garancija

V podjetju Cytion stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes