LS174T

300392

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

Celična linija LS147T je različica linije LS-180, obe pa sta pridobljeni iz adenokarcinoma debelega črevesa tipa B po Dukeu pri 58-letni beli bolnici. Izvirna linija LS-180 je bila vzpostavljena s kultivacijo razrezanega tumorskega tkiva 10 mesecev. LS-147T se skupaj z matično linijo odlikuje po izražanju številnih onkogenov, vključno z myc, myb, ras in fos, medtem ko je za druge, kot so sis, abl in ros, negativna. Ta linija izraža tudi visoko raven karcinoembrionalnega antigena (CEA), interlevkina 6 (IL-6) in interlevkina 10 (IL-10), ki so pomembni označevalci in potencialne tarče pri raziskavah kolorektalnega raka.
Te celice imajo več ključnih značilnosti epitelijskih celic debelega črevesa, vključno z obilnimi mikroviliji in intracitoplazemskimi mucinskimi vakuolami, ki so značilne za sekretorne celice v sluznici debelega črevesa. Študije elektronske mikroskopije so potrdile te strukturne podrobnosti, kar dodatno potrjuje njihov izvor in diferenciacijski status. Pomembno je, da so se celice LS-147T izkazale za tumorogene pri imunsko osiromašenih miših, pri čemer so ob subkutani inokulaciji z visoko gostoto celic dosledno proizvajale tumorje, kar potrjuje njihov maligni potencial.
Poleg tega je celična linija LS-147T še posebej dragocena v študijah, ki se osredotočajo na molekularne in imunološke vidike kolorektalnega raka. Poročali so, da je to linijo v primerjavi z matično linijo LS-180 lažje subkultivirati, zato je bolj praktična izbira za dolgoročne študije. Zaradi močne proizvodnje CEA v teh celicah, ki je bistveno višja kot pri drugih uveljavljenih linijah, kot je HT-29, je LS-147T pomemben model za razumevanje dinamike tumorskih označevalcev in raziskovanje ciljnih terapij pri kolorektalnem raku.

Tkivo	Debelo črevo
Bolezen	Adenokarcinom

Sinonimi

- Ls174T
- LS174t
- Ls-174-T
- LS-174-T
- LS 174 T
- LS174T
- Ls-174T
- LS 174T
- LS-174
- LS174

RAZVRSTITEV

Organizem	Človek
Seks	Ženska
Lastnosti rasti	Pripadnik
Stopnja biološke varnosti	1

ZNAČILNOSTI

Morfologija	Epitelijam podobni
Tumorigeničen	Da, na golih miših

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Kariotip

45,x z manjkajočim kromosomom x, vendar brez drugih kromosomskih aberacij

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

LS174T (kataloška številka Cytion 300392)

Davčna identifikacijska številka NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1384

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Ekspresija beljakovin

Antigen debelega črevesa 3 +, CEA +, p53 -, GFAP -, ekspresija mRNA +

Ekspresija antigena

HLA A2, B13, B50, krvna skupina O

Izoenzimi

ADA, 1: G6PD, B, PGM1, 1, PGM3, 2, PGD, A, ES-D, 1, PEP-D, 1

Onkogeni

Myc +, myb + , ras +, fos +, p53 +, sis -, abl -, ros -, src -

Profil mutacij

Celice LS-174T imajo mutacijo v kodonu 12 gena Kras: GGT(Wt Gly) >GAT(Asp)

Reversna transkriptaza	Negativni

Izdelki

Karcinoembrionalni antigen (CEA) 1944 ng/106 celic v 10 dneh, mucin, interlevkin-10 (IL-10), interlevkin-6 (IL-6)

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (številka izdelka Cytion 820100a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % FBS in 1 % NEAA

Reagenca za disociacijo	Accutase

Preusmeritev v drugo kulturo

Odstranite staro gojišče z adherentnih celic in jih sperite s PBS, ki ne vsebuje kalcija in magnezija. Za bučke T25 uporabite 3-5 ml PBS, za bučke T75 pa 5-10 ml. Nato celice popolnoma prekrijte z Accutase, pri čemer uporabite 1-2 ml za bučke T25 in 2,5 ml za bučke T75. Celice pustite inkubirati pri sobni temperaturi 8-10 minut, da se ločijo. Po inkubaciji celice nežno premešajte z 10 ml gojišča, da se ponovno suspendirajo, nato jih 3 minute centrifugirajte pri 300xg. Zavrzite supernatant, ponovno suspendirajte celice v svežem gojišču in jih prenesite v nove bučke, ki že vsebujejo sveže gojišče.

Gostota setve	5 do 8 x 10^4 celic/cm^2
Obnova tekočine	2 do 3-krat na teden
Obnova po odtaljevanju	Po odmrzovanju celice razporedite na ploščo v gostoti 5 x 10^4 celic/cm^2 in jim pustite, da si opomorejo od zamrzovanja in se prilepijo na ploščo, vsaj 24 ur.

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.
Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	58 let
Etnična pripadnost	Kavkaški

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Garancija

V podjetju Cytion stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes