SK-N-LO

300400

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

La linea cellulare SK-N-LO è una linea cellulare di neuroblastoma umano utilizzata nella ricerca per studiare il neuroblastoma e i meccanismi di apoptosi e le vie di segnalazione del cancro. È anche classificata come linea cellulare di tumore neuroectodermico primitivo (PNET) e porta il gene di fusione EWS-FLI1, comunemente presente nei tumori della famiglia del sarcoma di Ewing (ESFT). Questo gene di fusione deriva da una traslocazione cromosomica e svolge un ruolo chiave nel comportamento oncogenico di queste cellule tumorali.
Le cellule SK-N-LO sono particolarmente sensibili ad alcuni inibitori che colpiscono le vie di segnalazione oncogeniche. Ad esempio, l'inibitore GLI GANT61 ha dimostrato di indurre l'apoptosi indipendente dalla caspasi nelle cellule SK-N-LO. GANT61 interrompe la trascrizione mediata da GLI1 e GLI2 nella via di segnalazione Hedgehog (Hh), che è fondamentale per la sopravvivenza e la proliferazione cellulare in questa linea cellulare. Quando vengono trattate con GANT61, le cellule SK-N-LO mostrano cambiamenti morfologici associati all'apoptosi, come la condensazione della cromatina e la frammentazione nucleare. Inoltre, GANT61 riduce l'espressione di proteine come GLI2 e survivin, importanti per la progressione del ciclo cellulare e la sopravvivenza, mentre aumenta l'espressione di p21, un inibitore della chinasi ciclina-dipendente.
Inoltre, le cellule SK-N-LO sono state utilizzate per studiare la segnalazione dei recettori oppioidi. Queste cellule sono state modificate per esprimere il recettore μ-opioide, il che le rende un modello prezioso per studiare l'interazione tra l'analgesia indotta dagli oppioidi e le vie di segnalazione intracellulare. Ad esempio, alcuni studi hanno dimostrato che la morfina stimola la fosforilazione di Akt nelle cellule SK-N-LO attraverso la via PI3Kγ, un processo che può essere modulato dalla segnalazione di cAMP. Ciò evidenzia la versatilità delle cellule SK-N-LO nell'esplorare sia la biologia del cancro che la neurofarmacologia.

Tessuto	Cervello
Malattia	Tumore neuroectodermico primitivo
Sito metastatico	Midollo osseo

Sinonimi

- SK-N-L0
- SKN-LO
- SKNLO

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Maschio
Proprietà di crescita	Aderente
Livello di biosicurezza	1

CARATTERISTICHE

Morfologia	Simile all'epitelio

Cariotipo

Prodotto di frequenza del fenotipo: 0.00005

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

SK-N-LO (numero di catalogo Cytion 300400)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_4569

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamina, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (articolo Cytion numero 820100a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS e l'1% di NEAA

Reagente di dissociazione	Accutase

Subcoltura

Rimuovere il vecchio terreno dalle cellule aderenti e lavarle con PBS privo di calcio e magnesio. Per le fiasche T25, utilizzare 3-5 ml di PBS e per le fiasche T75, 5-10 ml. Quindi, coprire completamente le cellule con Accutase, utilizzando 1-2 ml per le fiasche T25 e 2,5 ml per le fiasche T75. Lasciare incubare le cellule a temperatura ambiente per 8-10 minuti per staccarle. Dopo l'incubazione, mescolare delicatamente le cellule con 10 ml di terreno per risospenderle, quindi centrifugare a 300xg per 3 minuti. Scartare il surnatante, risospendere le cellule in terreno fresco e trasferirle in nuove fiasche contenenti terreno fresco.

Densità di semina	Da 3 a 4 x 10^4 cellule/cm^2
Rinnovo dei fluidi	da 2 a 3 volte alla settimana

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo 50% di terreno basale + 40% di FBS + 10% di DMSO, o CM-1 (Cytion numero di catalogo 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crioindotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	10 anni
Etnia	Caucasico

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes