SK-N-LO

300400

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

De SK-N-LO cellijn is een humane neuroblastoom cellijn die gebruikt wordt in onderzoek naar neuroblastoom en de mechanismen van apoptose en kankersignalering. Het is ook geclassificeerd als een primitieve neuroectodermale tumor (PNET) cellijn en draagt het EWS-FLI1 fusiegen, dat vaak wordt gevonden in Ewing's sarcoom familie tumoren (ESFT). Dit fusiegen is het resultaat van een chromosomale translocatie en speelt een sleutelrol in het oncogene gedrag van deze tumorcellen.
SK-N-LO cellen zijn bijzonder gevoelig voor bepaalde remmers die zich richten op oncogene signaalwegen. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat de GLI-remmer GANT61 caspase-onafhankelijke apoptose induceert in SK-N-LO cellen. GANT61 verstoort GLI1- en GLI2-gemedieerde transcriptie in de Hedgehog (Hh)-signaleringsroute, die cruciaal is voor celoverleving en proliferatie in deze cellijn. Bij behandeling met GANT61 vertonen SK-N-LO cellen morfologische veranderingen die geassocieerd worden met apoptose, zoals chromatinecondensatie en nucleaire fragmentatie. Bovendien vermindert GANT61 de expressie van eiwitten zoals GLI2 en survivin, die belangrijk zijn voor celcyclusprogressie en overleving, terwijl de expressie van p21, een cycline-afhankelijke kinaseremmer, toeneemt.
Daarnaast zijn SK-N-LO cellen gebruikt om de opioïde receptor signalering te bestuderen. Deze cellen zijn ontworpen om de μ-opioïde receptor tot expressie te brengen, waardoor ze een waardevol model zijn voor het onderzoeken van de interactie tussen opioïde-geïnduceerde analgesie en intracellulaire signaalwegen. Studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat morfine Akt-fosforylering stimuleert in SK-N-LO cellen via de PI3Kγ-route, een proces dat gemoduleerd kan worden door cAMP-signalering. Dit benadrukt de veelzijdigheid van SK-N-LO cellen bij het onderzoeken van zowel kankerbiologie als neurofarmacologie.

Weefsel	Hersenen
Ziekte	Primitieve neuroectodermale tumor
Plaats van uitzaaiingen	Beenmerg

Synoniemen

- SK-N-L0
- SKN-LO
- SKNLO

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Man
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Epitheelachtig

Karyotype

Fenotype Frequentie Product: 0.00005

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

SK-N-LO (Cytion catalogusnummer 300400)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_4569

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion artikelnummer 820100a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS en 1% NEAA

Dissociatiereagens	Accutase

Heruitplanten

Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugeren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.

Zaaidichtheid	3 tot 4 x 10^4 cellen/cm^2
Vloeistofverversing	2 tot 3 keer per week

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we 50% basaal medium + 40% FBS + 10% DMSO, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en cryogeïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	10 jaar
Etnische afkomst	Kaukasisch

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes