EB1

300403

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

Az EB1 sejtvonal egy humán eredetű sejtvonal, amelyet a Burkitt-limfóma biopsziás töredékeiből és sejtcsomóiból hoztak létre. Ezt a vonalat eredetileg 10% humán szérummal kiegészített Eagle bazális táptalajon tenyésztették. Az egyedi növekedési feltételek elősegítették olyan sejtek kialakulását, amelyek túlnyomórészt szabadon lebegő egyedek vagy kettősök formájában növekedtek. Az EB1 sejtek jellemző duplázódási ideje körülbelül 48 óra, ami kiemeli gyors proliferációs sebességüket, ami a limfoblasztok egyik jellemző tulajdonsága. Morfológiailag az EB1 sejtek egységes, megváltozott limfoblaszt jellegzetességeket mutatnak, ami arra utal, hogy nyirokszövetből származnak. A sejtvonalat széles körben használták a Burkitt-limfóma tanulmányozásában, betekintést nyújtva a nyirokcsomós rosszindulatú daganatok patológiájába. Értékes modellként szolgál a nyiroksejtek biológiai viselkedésének különböző kísérleti körülmények közötti kutatásához, segítve a terápiás célpontok feltárását és a limfóma progressziójának megértését.

Szövet	Vér
Betegség	Burkitt limfóma

Szinonimák

- EB-1
- Epstein-Barr-1

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Nő
Növekedési tulajdonságok	Felfüggesztés
Biológiai biztonsági szint	2

JELLEMZŐK

Morfológia	Polymorf sejtek, nagy sejtmagok, mikrovillák kialakulása
Sejttípus	B-limfocita

Kariotípus

Kromoszóma gyakorisági eloszlás 30 sejt: 2n = 46. A sejtvonal aneuploid emberi nőstény, kromoszómaszámuk a dipoidhoz közeli tartományban van. A normális N8, N11 és N14 kromoszómák monoszómák, a többi autoszóma általában párosított. Az x kromoszóma leggyakrabban triszómikus. Négy marker kromoszóma található. Ezek közül kettő (M1 és M3 markerek) az N8 és N14 kromoszómák közötti reciprok transzlokációt érinti, amely a legtöbb Burkitt-limfóma-sejtvonalhoz társul.

Kettőzési idő	48 óra

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

EB1 (Cytion katalógusszám: 300403)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_2027

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Izoenzimek

PGM1, ESD1, GLO-1, G6PD, B

Vírusok

Herpeszvírust tartalmaz

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion 820700a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt 10% hővel inaktivált FBS-szel egészítsük ki

Átültetés

A sejteket szubkultúrázni kell a szuszpenzió egy részének friss, új, friss tápfolyadékkal előretöltött sejttenyésztő lombikokba történő átültetésével. Alternatív megoldásként a klasztereket centrifugálással össze lehet gyűjteni és friss tápfolyadékban újra szuszpendálni.

Ültetési sűrűség	0,1 x 10^6 sejt/ml
Folyadékcsere	hetente 2-3 alkalommal
Az olvadás utáni helyreállás	A felolvasztás után hagyjuk, hogy a sejtek legalább 24 órán keresztül regenerálódjanak a fagyasztás után

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	9 év
Etnikai hovatartozás	Afrikai

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes