Wilms6

300415

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

La lignée cellulaire Wilms6 a été établie à partir d'une tumeur de Wilms primaire chez un patient pédiatrique présentant une mutation germinale du gène WT1. Cette lignée cellulaire est définie par une mutation homozygote non-sens dans le gène WT1 (c.1168 C>T, p.R390X), qui se traduit par une protéine WT1 tronquée et non fonctionnelle. La protéine WT1 est un régulateur essentiel du développement du rein, et sa perte est fortement associée à la tumeur de Wilms, en particulier dans les cas présentant une différenciation mésenchymateuse. La lignée cellulaire Wilms6 est un modèle important pour l'étude des effets tumorigènes de la perte complète de la protéine WT1, en particulier dans le contexte des tumeurs qui présentent à la fois des caractéristiques épithéliales et mésenchymateuses.
Les cellules Wilms6 sont également porteuses d'une mutation du gène CTNNB1, affectant spécifiquement la sérine 45 (p.S45F), un site clé pour la phosphorylation qui régule la dégradation de la β-Caténine. Cette mutation entraîne la stabilisation et l'accumulation nucléaire de la β-Caténine, ce qui provoque l'activation constitutive de la voie de signalisation Wnt. L'activation aberrante de la signalisation Wnt est un moteur connu de la prolifération cellulaire et de la tumorigénèse dans les tumeurs de Wilms, ce qui fait de Wilms6 un outil précieux pour étudier le rôle de la dysrégulation de la voie Wnt dans les tumeurs présentant des mutations WT1.
Sur le plan phénotypique, les cellules Wilms6 présentent une morphologie mésenchymateuse, avec une forte expression de vimentine et l'absence de marqueurs épithéliaux tels que la cytokératine, ce qui reflète la nature stromale de la tumeur d'origine. Il a été démontré que ces cellules possèdent un potentiel de différenciation limité mais notable, y compris la capacité de se différencier en cellules de type musculaire dans des conditions spécifiques, ce qui reflète la différenciation mésenchymateuse observée dans certaines tumeurs de Wilms. Les études protéomiques de Wilms6 ont identifié l'activation de plusieurs récepteurs tyrosine kinases (RTK), dont le PDGFRβ et l'AXL, qui sont impliqués dans la promotion de la survie, de la prolifération et de la migration des cellules. L'activation en aval de voies de signalisation telles que MAPK et PI3K/AKT souligne encore la nature agressive de cette lignée cellulaire.
Dans l'ensemble, la lignée cellulaire Wilms6 constitue un modèle crucial pour l'exploration des mécanismes moléculaires qui sous-tendent le développement des tumeurs de Wilms, en particulier dans les cas de perte complète de WT1 combinée à l'activation de la signalisation Wnt. Ses caractéristiques génétiques et phénotypiques en font une excellente plateforme pour étudier l'interaction entre la déficience en WT1 et les voies de signalisation aberrantes, ce qui permet de découvrir des cibles thérapeutiques potentielles pour ce type de tumeur agressive.

Tissu	Rein
Maladie	Tumeur de Wilms

Applications

Modèle de culture cellulaire in vitro. Études biochimiques

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Homme
Propriétés de croissance	Adepte
Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	En forme de fuseau
Type de cellule	Cellules de Wilms

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIANTS

Référence

Wilms6 (numéro de catalogue Cytion 300415)

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_A5SI

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Profil mutationnel

Statut de la mutation WT1 : homozygote c.1168C>T, p.R390x, LOH : 11p11-11pter, statut de la mutation CTNNB1 : homozygote del TCT, p.DS45

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

Kit MSCGM (de Lonza)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.
Réactif de dissociation	Accutase

Repiquage

Retirer l'ancien milieu des cellules adhérentes et les laver avec du PBS dépourvu de calcium et de magnésium. Pour les flacons T25, utiliser 3-5 ml de PBS, et pour les flacons T75, 5-10 ml. Ensuite, recouvrir complètement les cellules avec Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laisser les cellules incuber à température ambiante pendant 8-10 minutes pour les détacher. Après incubation, mélanger délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifuger à 300xg pendant 3 minutes. Jeter le surnageant, remettre les cellules en suspension dans du milieu frais et les transférer dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	15 mois
Origine ethnique	Caucasien

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB