Wilms6

300415

INFORMACJE OGÓLNE

Opis

Linia komórkowa Wilms6 została utworzona z pierwotnego guza Wilmsa u pacjenta pediatrycznego z mutacją germinalną WT1. Ta linia komórkowa jest zdefiniowana przez homozygotyczną mutację nonsensowną w genie WT1 (c.1168 C>T, p.R390X), która skutkuje skróconym i niefunkcjonalnym białkiem WT1. WT1 jest krytycznym regulatorem rozwoju nerek, a jego utrata jest silnie związana z guzem Wilmsa, szczególnie w przypadkach wykazujących różnicowanie mezenchymalne. Linia komórkowa Wilms6 jest ważnym modelem do badania nowotworowych skutków całkowitej utraty WT1, szczególnie w kontekście guzów, które wykazują zarówno cechy nabłonkowe, jak i mezenchymalne.
Komórki Wilms6 są również nosicielami mutacji w genie CTNNB1, w szczególności wpływającej na serynę 45 (p.S45F), kluczowe miejsce fosforylacji, które reguluje degradację β-kateniny. Mutacja ta prowadzi do stabilizacji i akumulacji jądrowej β-kateniny, co skutkuje konstytutywną aktywacją szlaku sygnałowego Wnt. Nieprawidłowa aktywacja sygnalizacji Wnt jest znanym czynnikiem napędzającym proliferację komórek i nowotworzenie w guzach Wilmsa, dzięki czemu Wilms6 jest cennym narzędziem do badania roli dysregulacji szlaku Wnt w guzach z mutacją WT1.
Fenotypowo, komórki Wilms6 wykazują morfologię mezenchymalną, z silną ekspresją wimentyny i brakiem markerów nabłonkowych, takich jak cytokeratyna, co odzwierciedla zrębową naturę pierwotnego guza. Wykazano, że komórki te mają ograniczony, ale znaczący potencjał różnicowania, w tym zdolność do różnicowania się w komórki mięśniopodobne w określonych warunkach, co odzwierciedla różnicowanie mezenchymalne obserwowane w niektórych guzach Wilmsa. Badania proteomiczne guzów Wilmsa6 zidentyfikowały aktywację wielu receptorowych kinaz tyrozynowych (RTK), w tym PDGFRβ i AXL, które są zaangażowane w promowanie przeżycia, proliferacji i migracji komórek. Aktywacja szlaków sygnałowych, takich jak MAPK i PI3K/AKT, dodatkowo podkreśla agresywny charakter tej linii komórkowej.
Ogólnie rzecz biorąc, linia komórkowa Wilms6 służy jako kluczowy model do badania mechanizmów molekularnych leżących u podstaw rozwoju guza Wilmsa, szczególnie w przypadkach całkowitej utraty WT1 w połączeniu z aktywacją sygnalizacji Wnt. Jego cechy genetyczne i fenotypowe sprawiają, że jest to doskonała platforma do badania interakcji między niedoborem WT1 a nieprawidłowymi szlakami sygnalizacyjnymi, zapewniając wgląd w potencjalne cele terapeutyczne dla tego agresywnego typu nowotworu.

Chusteczka	Nerka
Choroba	Guz Wilmsa

Zastosowania

Model hodowli komórkowej in vitro. Badania biochemiczne

KLASYFIKACJA

Organizm	Człowiek
Seks	Mężczyzna
Właściwości związane ze wzrostem	Zwolennik
Poziom bezpieczeństwa biologicznego	1

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Morfologia	Wrzecionowaty kształt
Typ komórki	Komórki Wilmsa

IDENTYFIKATORY

Źródło

Wilms6 (numer katalogowy Cytion 300415)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Numer identyfikacji podatkowej NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_A5SI

EKSPRESJA I PODATNOŚĆ

Profil mutacji

Status mutacji WT1: homozygotyczny c.1168C>T, p.R390x, LOH: 11p11-11pter, status mutacji CTNNB1: homozygotyczny del TCT, p.DS45

POSTĘPOWANIE I HODOWLA

Pożywka hodowlana

Zestaw MSCGM (od Lonza)

Atmosfera inkubacyjna	37°C, 5%CO2, nawilżona atmosfera.
Odczynnik dysocjacyjny	Accutase

Hodowla komórek w subkulturze

Usuń starą pożywkę z przylegających komórek i przemyj je PBS, który nie zawiera wapnia i magnezu. W przypadku kolb T25 należy użyć 3-5 ml PBS, a w przypadku kolb T75 5-10 ml. Następnie całkowicie pokryj komórki Accutase, używając 1-2 ml dla kolb T25 i 2,5 ml dla kolb T75. Pozwól komórkom inkubować w temperaturze pokojowej przez 8-10 minut, aby je oddzielić. Po inkubacji delikatnie wymieszaj komórki z 10 ml pożywki, aby ponownie je zawiesić, a następnie odwiruj przy 300xg przez 3 minuty. Odrzucić supernatant, ponownie zawiesić komórki w świeżej pożywce i przenieść je do nowych kolb zawierających już świeżą pożywkę.

Rozmrażanie i hodowla

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA JAKOŚCI I KRIOKONSERWACJA

Bezpłodność

Zanieczyszczenie mykoplazmą jest wykluczane przy użyciu zarówno testów opartych na PCR, jak i metod wykrywania mykoplazmy opartych na luminescencji.
Aby upewnić się, że nie ma zanieczyszczenia bakteriami, grzybami lub drożdżami, hodowle komórkowe są poddawane codziennym kontrolom wizualnym.

Pożywka do zamrażania	Jako pożywki do kriokonserwacji używamy kompletnej pożywki wzrostowej (w tym FBS) + 10% DMSO w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności po rozmrożeniu lub CM-1 (numer katalogowy Cytion 800100), która zawiera zoptymalizowane osmoprotektanty i stabilizatory metaboliczne w celu zwiększenia regeneracji i zmniejszenia stresu wywołanego kriokonserwacją.

Warunki przechowywania

W celu długotrwałego przechowywania należy umieścić fiolki w ciekłym azocie w fazie lotnej w temperaturze od -150 do -196 °C.
Przechowywanie w temperaturze -80 °C jest dopuszczalne tylko jako krótki etap przejściowy przed przeniesieniem do ciekłego azotu.

Warunki wysyłki

Linie komórkowe poddane kriokonserwacji są wysyłane w suchym lodzie w zatwierdzonych, izolowanych opakowaniach z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, aby utrzymać temperaturę około -78°C przez cały czas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy natychmiast sprawdzić pojemnik i bezzwłocznie przenieść fiolki do odpowiedniego miejsca przechowywania.

DARCZYŃCA

Wiek dawcy	15 miesięcy
Pochodzenie etniczne	Kaukaski

KWESTIE PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa

Planując przechowywanie kriofiolek w ciekłym azocie w celu ich późniejszego rozmrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Niezbędne są odpowiednie rękawice i odzież ochronna, a podczas przenoszenia zamrożonych próbek do lub ze zbiornika z ciekłym azotem wymagane jest stosowanie maski lub okularów ochronnych. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń spowodowanych potencjalnymi eksplozjami kriowialu podczas wyjmowania, które mogą skutkować wyrzuceniem ostrych fragmentów.

Gwarancja

W Cytion gwarantujemy jakość i żywotność naszych produktów.
Gwarantujemy, że nasze komórki będą żywotne na początku hodowli przez 60 dni po wysyłce z naszych zakładów.
Zapewniamy, że wszystkie materiały są zgodne ze specyfikacjami opisanymi w certyfikacie analizy i/lub karcie produktu
Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Oświadczeniu gwarancyjnym

Wymagana umowa o transferze materiałów	Yes