Wilms10T

300417

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

A Wilms10T sejtvonal egy gyermekkori nefroblastómában, Wilms-tumorban szenvedő betegből nyert primer Wilms-tumor mintából származik. Ezt a sejtvonalat a WT1 gén homozigóta delécióját jellemzi, ami a WT1 funkció teljes elvesztéséhez vezet, amely egy kritikus gén, amely részt vesz a vese fejlődésében és a normális vese differenciálódás fenntartásában. Sok más Wilms-tumor-sejtvonaltól eltérően a Wilms10T-ben nem expresszálódik a WT1 fehérje, ami tükrözi az ebben a tumor altípusban jelen lévő súlyos genetikai elváltozásokat. Ezenkívül a Wilms10T sejtvonal heterozigozitásvesztést (LOH) mutat a 11p15 kromoszómarégióban, amely olyan fontos géneket tartalmaz, mint az IGF2, ami tovább növeli tumorigén tulajdonságait.
A Wilms10T sejtek stabilan normális kariotípussal rendelkeznek, a WT1 régió specifikus delécióján kívül nincsenek jelentősebb kromoszóma-átrendeződések. Ezt a sejtvonalat széles körben használták a WT1 teljes elvesztésének a tumorbiológiára gyakorolt hatásának tanulmányozására, beleértve a sejtek proliferációjára, differenciálódására és a különböző jelátviteli útvonalakra adott válaszra gyakorolt hatását. A sejtek megtartják a mesenchymális jellegzetességeket, olyan markereket expresszálva, mint a vimentin, miközben hiányoznak az epithelialis markerek, mint a citokeratin, ami a stromális eredetükre utal.
Jelentős kutatások összpontosítottak a Wilms10T sejtekben aktív jelátviteli útvonalakra. Proteomikai vizsgálatok kimutatták, hogy ezek a sejtek számos receptor-tirozin-kináz (RTK), például az IGF1R, PDGFRβ és AXL aktiválódását mutatják, amelyekről ismert, hogy a tumorigenezist irányítják. Emellett a Wilms10T sejtekben aktiválódnak a downstream jelátviteli útvonalak, beleértve a MAPK és a PI3K/AKT útvonalakat, ami hozzájárul agresszív tumorfenotípusukhoz. A Wilms10T átfogó jellemzése értékes modellé teszi a teljes WT1-veszteséggel járó Wilms-tumor molekuláris alapjainak vizsgálatához, valamint az ebben az agresszív tumor altípusban lehetséges terápiás célpontok feltárásához.

Szövet	Vese
Betegség	Wilms-tumor

Alkalmazások

In vitro sejttenyésztési modell és biokémiai vizsgálatok

Szinonimák

- Wilms10

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Nő
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Orsó alakú
Sejttípus	Wilms sejtek
Kettőzési idő	46 óra

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

Wilms10T (Cytion katalógusszám: 300417)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_A5SL

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Mutációs profil

WT1 mutációs státusz: homozigóta del WT1 a del11p13-on belül. LOH: nincs a 11p13-ban, de UPD a 11p15-ben. CTNNB1 mutációs státusz: homozigóta del TCT, p.DS45, UPD 3p

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

MSCGM kit (a Lonzától)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.
Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Ültetési sűrűség	4 x 10^4 sejt/cm^2
Folyadékcsere	hetente 1-2 alkalommal

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	2 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes