Wilms11

300420

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

Wilms11-cellelinjen ble avledet fra en primær Wilms-svulst (nefroblastom) hos en pediatrisk pasient. I motsetning til mange andre Wilms-svulstcellelinjer er Wilms11 karakterisert ved tilstedeværelsen av villtype WT1, noe som betyr at den ikke har mutasjoner i WT1-genet, som vanligvis forbindes med Wilms-svulster som utviser mer aggressive eller stromale fenotyper. Wilms11-svulsten viste imidlertid betydelig stromal differensiering, med store områder med rabdomyomatøs differensiering, noe som tyder på mesenkymale elementer i svulsten. Tilstedeværelsen av villtype WT1, kombinert med svulstens stromale differensiering, gir en unik modell for å forstå Wilms-svulstens biologi i tilfeller der WT1-mutasjoner er fraværende.
Genetiske studier av Wilms11 har vist at denne cellelinjen bærer en tumorspesifikk mutasjon i CTNNB1, genet som koder for β-Catenin, som spiller en avgjørende rolle i Wnt-signalveien. I Wilms11 påvirker denne mutasjonen serin 45, et viktig fosforyleringssted som er involvert i nedbrytningen av β-Catenin. CTNNB1-mutasjonen fører til stabilisering av β-Catenin, noe som fører til akkumulering og konstitutiv aktivering av Wnt-signalveien, som er en drivkraft for celleproliferasjon og tumorutvikling. Dette gjør Wilms11 til en viktig modell for å studere samspillet mellom Wnt-signalering og utvikling av Wilms-svulster, spesielt i tilfeller der WT1 forblir intakt.
Proteomanalyser av Wilms11 har avdekket aktivering av flere reseptortyrosinkinaser (RTK-er), inkludert PDGFRβ og AXL, som er involvert i å drive tumorcellevekst og -overlevelse. Nedstrøms signalveier, som MAPK- og PI3K/AKT-veiene, aktiveres også i Wilms11-celler, noe som bidrar til deres tumorgeniske atferd. Wilms11-cellenes evne til å gjennomgå mesenkymal differensiering, spesielt rabdomyomatøs differensiering, fremhever deres potensial som modell for å studere de mesenkymale komponentene i Wilms-svulster. Wilms11 er et verdifullt verktøy for å undersøke de molekylære mekanismene som driver Wilms-svulstutvikling i fravær av WT1-mutasjoner, men i sammenheng med aktivering av Wnt-stien.

Vev	Nyre
Sykdom	Wilms-svulst

Søknader

In vitro-cellekulturmodell. Biokjemiske studier

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Tilhenger
Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Spindelformet
Celletype	Wilms-celler

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

Wilms11 (Cytion katalognummer 300420)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_A5SM

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Mutasjonsprofil

WT1-mutasjonsstatus: homozygot WT1 c.901c>T, p.R301x. LOH: . CTNNB1 mutasjonsstatus: villtype

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

MSCGM-sett (fra Lonza)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.
Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Subkultivering

Fjern det gamle mediet fra de adherente cellene, og vask dem med PBS uten kalsium og magnesium. Bruk 3-5 ml PBS for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber. Dekk deretter cellene helt med Accutase, med 1-2 ml for T25-kolber og 2,5 ml for T75-kolber. La cellene inkubere i romtemperatur i 8-10 minutter for å løsne dem. Etter inkubasjon blandes cellene forsiktig med 10 ml medium for å resuspendere dem, og sentrifuger deretter ved 300xg i 3 minutter. Kast supernatanten, resuspender cellene i nytt medium, og overfør dem til nye kolber som allerede inneholder nytt medium.

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	22 måneder

Etnisitet	Kaukasisk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes