NCI-H358

300430

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

NCI-H358, známa aj ako H-358 alebo NCIH358, je epiteliálna bunková línia odvodená od pacienta s bronchioalveolárnym karcinómom, podtypom nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC). Tieto bunky vykazujú ultraštruktúrne charakteristiky typické pre Clara bunky, ako sú špecifické cytoplazmatické znaky. Bunky NCI-H358 majú mimoriadny význam vo výskume rakoviny zameranom na NSCLC, najmä pri skúmaní biológie a liečby adenokarcinómov pľúc.
Táto bunková línia má zásadný význam pre štúdium účinnosti terapií zameraných na receptor epidermálneho rastového faktora (EGFR), keďže mutácie v EGFR sú významnou témou pri liečbe NSCLC. Okrem toho sú bunky NCI-H358 cenné na skúmanie úlohy mutácií KRAS, ktoré sú rozšírené pri rakovine pľúc a o ktorých je známe, že sú motorom onkogénnej aktivity. Štúdium týchto mutácií v bunkách NCI-H358 pomáha objasniť molekulárne cesty, ktoré sa podieľajú na progresii rakoviny pľúc a rezistencii voči liečbe.
Bunková línia NCI-H358 obsahuje homozygotnú deléciu p53, hlavného nádorového supresora. Bunková línia rakoviny pľúc H358 sa používa aj na posúdenie potenciálu nových terapeutických prístupov, ako je SOS1 PROTAC, zameraných na špecifické onkogénne dráhy.
Celkovo možno povedať, že bunková línia NCI-H358, odvodená od bronchioalveolárneho karcinómu, je dôležitým nástrojom vo výskume NSCLC. Je užitočná na štúdium terapií cielených na EGFR a úlohy mutácií KRAS pri rakovine pľúc. Jeho využitie vo výskume rakoviny sa rozširuje na vývoj nových terapeutických stratégií zameraných na zmiernenie účinkov onkogénnych mutácií a zlepšenie výsledkov liečby pacientov s rakovinou pľúc.

Tkanivo	Pľúca
Choroba	Minimálne invazívny adenokarcinóm pľúc

Synonymá

- NCI-H358
- H-358
- NCIH358

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Muž
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Typ bunky	Klubová bunka
Tumorigenický	Áno, na nahých myšiach.

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

NCI-H358 (katalógové číslo Cytion 300430)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1559

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Expresia proteínov

UGT -, GST +, PST +, p53 -

Mutčný profil

Homozygotne odstránený P53

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % FBS

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmnožovanie kultúr

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	Vek nešpecifikovaný
Etnická príslušnosť	Európska

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes