TF-1

300434

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітини TF-1 - це еритробласти, виділені з кісткового мозку 35-річного азійського чоловіка, у якого в 1987 році діагностували важку панцитопенію. Ці клітини є ключовою моделлю для вивчення складних процесів проліферації та диференціації всередині мієлоїдних клітин-попередників. Як клітинна лінія, TF-1 широко використовується в гематологічних дослідженнях для розуміння основних механізмів, що регулюють регуляцію клітинного циклу та розвиток мієлоїдних ліній.
Окрім своєї основної ролі в гематологічних дослідженнях, клітини TF-1 слугують надійною системою для вивчення впливу різних цитокінів на виживання та ріст клітин. Їх залежність від специфічних факторів росту, таких як гранулоцитарно-макрофагальний колонієстимулюючий фактор (GM-CSF) та інтерлейкін-3 (IL-3) для проліферації, робить їх чудовим інструментом для вивчення цитокінових сигнальних шляхів. Ця характеристика також робить клітини TF-1 корисними для оцінки ефективності нових фармакологічних засобів, спрямованих на модуляцію цих шляхів, тим самим роблячи значний внесок у терапевтичний прогрес у лікуванні мієлоїдних розладів та інших пов'язаних з ними захворювань.

Тканина	Кістковий мозок
Хвороба	Еритролейкоз

Застосування

Клітинну лінію TF-1 можна застосовувати в різних системах завдяки її чутливості до багатьох цитокінів. Вони забезпечують хорошу систему для дослідження проліферації та диференціювання мієлоїдних клітин-попередників. Чутливі до GM-CSF, IL-3, EPO.

Синоніми

- TF1
- MFD-1

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Чоловік
Характеристики росту	Підвіска
Рівень біобезпеки	1

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

TF-1 (номер за каталогом Cytion 300434)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_0559

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Рецептори, що експресуються

Клітини TF-1 не експресують глікофорин А або карбонілгідразу I.

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

RPMI 1640, w: 2,1 мМ стабільний глютамін, w: 2,0 г/л NaHCO3 (номер за каталожним номером 820700a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10 % FBS, 5 нг/мл GM-CSF; для тривалого культивування: IL-3

Пересадка в нове середовище

Ініціюйте культури з щільністю клітин 2 x 10^5 клітин/мл і підтримуйте їх в діапазоні від 1 x 10^5 до 1 x 10^6 клітин/мл. Для субкультурування перенесіть суспензію клітин у свіжу колбу для культивування клітин, попередньо заповнену правильним об'ємом свіжого культурального середовища.

Щільність висіву	> 2 x 10^5 клітин/мл
Оновлення рідини	2-3 рази на тиждень

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	35 років

Етнічна приналежність	Японський

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes