NCI-H82

300442

معلومات عامة

الوصف

من قبل أ. ف. غازدار وزملائه في عام 1978 من السائل الجنبي لمريض مصاب بسرطان الخلايا الصغيرة في الرئة. لم تكن NCI-H82 تم اشتقاق خط الخلايا مورفولوجية الورم الأصلي مميزة لسرطان الخلايا الصغيرة في الرئة. هذا الخط هو متغير كيميائي حيوي ومورفولوجي لسرطان الخلايا الصغيرة في الرئة L-DOPA الذي يعبر عن إنزيم الإنولاز المحدد للخلايا العصبية وإنزيم الدماغ المتساوي من الكرياتين كيناز. ولا يحتوي على مستويات يمكن اكتشافها من إنزيم c-myc بحجم غير طبيعي (3.7 كيلو بايت). يتم تضخيم تسلسل الحمض النووي p53 أو بوميبسين. تنتج الخلايا الحمض النووي الريبي المرسال decarboxylase بالنسبة للخلايا الطبيعية. تم الإبلاغ عن أن الخلايا تُعبّر عن مستقبلات c-myc بحوالي 25 ضعفًا، وهناك زيادة بمقدار 24 ضعفًا في الحمض النووي الريبي ANP و Ki-ras و Ha-ras و v-fms و v-fes لا يُغيّر نمط نموها. تَصْبُغ الخلايا بصبغة إيجابية للخلايا العصبية والفيمينتين. هناك تعبير عن ANP الوظيفية، لكن العلاج ب N-ras و c-raf 1 mRNAs.

الأنسجة	الرئة
المرض	سرطان الخلايا الصغيرة في الرئة
موقع الانتشار	الانصباب الجنبي

المرادفات

- NCI-H-82
- H82
- H-82
- NCI H82
- NCIH82
- H82sclc

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	ذكر
خصائص النمو	التعليق
مستوى السلامة البيولوجية	1

الخصائص

المورفولوجيا	شبيه بالظهارة
مُسبِّب للأورام	نعم، تشكل أوراماً قابلة للزرع مع أنسجة غير نمطية للورم السرطاني الحلقي الشوكي في الفئران العارية

النمط الكروموسومي

هذا خط خلايا بشرية ثلاثية الصبغيات الصبغية تقريباً. يبلغ العدد النموذجي للكروموسوم 58، وتبلغ نسبة تعدد الصبغيات الصبغية 44% مع تعدد الصبغيات Q. في المستحضرات ذات النطاقات Y الطبيعي. لم يتم الكشف عن كروموسوم x الصبغية بنسبة 3%. تحتوي كل خلية على نسختين من كروموسوم

المعرّفات

المرجع

NCI-H82 (الرقم الكتالوجي لسيتيون 300442)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

رقم التعريف الضريبي لدى NCBI	9606
سيلوصور	CVCL_1591

التعبير والقابلية للإصابة

المستقبلات المُعبَّر عنها

مستقبلات عامل النمو الشبيه بالأنسولين II (IGF II)، البيتيد الأذيني المدر للبول (ANP)

التعبير البروتيني

إيجابي P53

الإيزوزيمات

G6PD، B، PGM1، 1-2، PGM3، 1-2، ES-D، 1، Me-2، 1، AK-1، 1، GLO-1، 1، GLO-1، 1، 0.0082 = منتج تكرار النمط الظاهري

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

RPMI 1640، 2.0 جم/لتر، ث: 2.0 مللي مولار جلوتامين مستقر، NaHCO3 (820700 رقم المادة aمن سايتيون)

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

قم بتزويد الوسط ب 10٪ من ال FBS

إعادة الاستنبات

حافظ على الثقافات عن طريق إضافة أو استبدال الوسط بشكل دوري. ابدأ الثقافات بكثافة 5 × 10^5 خلية/مل وحافظ على تركيز الخلايا في نطاق 3 × 10^5 إلى 1 × 10^6 خلية/مل لتحقيق النمو الأمثل.

تجديد السوائل	إلى 3 مرات في الأسبوع 2

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية، (رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

عمر المتبرع	سنة 41
الأصل العرقي	قوقازي

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

نلتزم في Cytion، في Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes