SCLC-22H

300445

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

SCLC-22H rakuliin loodi meessoost patsiendi perikardiavoolust, kellel oli diagnoositud kaerarakutüüpi väikerakk-kopsuvähk (SCLC), mis on agressiivne kopsuvähi alatüüp. SCLC-22H rakuliinil, mis on saadud väikerakk-kopsuvähi (SCLC) patsiendilt, on nii SCLC klassikalisele kui ka varianditüübile iseloomulikud tunnused. See vahepealne olemus muudab selle väärtuslikuks mudeliks nende kahe alatüübi vahelise ülemineku uurimiseks. Rakuliinil on morfoloogilised tunnused, näiteks väikeste ja suurte rakkude sarnased tunnused, mis on tüüpiliselt esinevad nii väike- kui ka suurrakulise kopsuvähi puhul, eriti kui seda uuritakse ksenotransplantaatides.
SCLC-22H ekspresseerib mitmeid neuroendokriinseid markereid, sealhulgas neuronispetsiifilist enolaasi (NSE), kartsinoembryonaalset antigeeni (CEA), bombesiini ja kreatiinkinaas-BB (CK-BB), mis on klassikalise SCLC tunnusjooned. Võrreldes lähedalt seotud SCLC-21H rakuliiniga on SCLC-22H-l siiski aeglasem populatsiooni kahekordistumise aeg ja madalam kolooniate moodustamise efektiivsus. Need biokeemilised ja kineetilised omadused eristavad seda SCLC-21H-st, millel on rohkem variantide alatüübi tunnuseid, mille morfoloogia on valdavalt suurrakuline.
SCLC-22H peetakse oluliseks mudeliks, et mõista in vivo üleminekut klassilisest SCLC-st variandiks. Selle segatud fenotüüp viitab sellele, et see kujutab endast vahe- või üleminekufaasi, mis annab ülevaate sellest, kuidas arenevad agressiivsete kopsuvähkide puhul raviresistentsus ning muutused rakkude morfoloogias ja kasvutunnustes.

Kude	Kopsud
Haigus	Väikerakk-kartsinoom
Metastaaside asukoht	Perikardiaväljaheide

Sünonüümid

- SCLC22H

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Inimene
Sugu	Mees
Kasvuvõime	Vedrustus
Bioloogilise ohutuse tase	1

OMADUSED

Morfoloogia	Ujuvad rakuagregaadid, mõned üksikud rakud
Tuumorigeenne	Jah, alasti hiirtel

Karyotüüp

Modaalne number 43

TUNNUSED

Viide

SCLC-22H (Cytioni kataloginumber 300445)

NCBI maksukood	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_2186

AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

Pöördtranskriptaas	Negatiivne

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilne glutamiin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820700a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Kultuuri edasikasvatamine

Säilitage kultuure, lisades või asendades perioodiliselt kasvukeskkonda. Alustage kultuuride kasvatamist tihedusega 5 x 10^5 rakku/ml ja hoidke rakkude kontsentratsioon vahemikus 1 x 10^5 kuni 1 x 10^6 rakku/ml optimaalse kasvu tagamiseks.

Külvitihedus	1 x 10^5 rakku/ml
Vedeliku vahetus	1 kuni 2 korda nädalas

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüokonserveerimissöötmena kasutame 50% põhikeskkonda + 40% FBS + 10% DMSO ehk CM-1 (Cytioni kataloginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüoostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Doonori vanus	46 aastat
Etniline kuuluvus	Kaukaasia

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""'x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes