SW-1736

300453

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

SW-1736 — це клітинна лінія анапластичної карциноми щитоподібної залози людини, яка зазвичай використовується для дослідження агресивних і слабодиференційованих ракових пухлин щитоподібної залози. Ця клітинна лінія була спочатку отримана від пацієнта з недиференційованою карциномою щитоподібної залози — рідкісною, але дуже агресивною формою раку, що характеризується швидким прогресуванням і несприятливим прогнозом. Клітинна лінія SW-1736 широко використовується в дослідженнях раку завдяки своїй здатності відтворювати високозлоякісні особливості анапластичного раку щитоподібної залози (АТС), включаючи резистентність до стандартних методів лікування, таких як хіміотерапія та опромінення.
Однією з видатних особливостей клітинної лінії SW-1736 є її часте використання в дослідженнях, що зосереджуються на аномаліях клітинного поділу та метастазуванні пухлин. Дослідники спостерігали атипові випадки клітинного поділу, такі як поділ від однієї до чотирьох клітин, що свідчить про агресивні та неконтрольовані моделі росту, які спостерігаються в анапластичних карциномах щитоподібної залози. Крім того, клітини SW-1736 були трансфіковані різними репортерними генами, такими як Luc, що дозволило проводити неінвазивні дослідження in vivo. Ці дослідження часто проводяться на мишах для вивчення метастатичного потенціалу раку щитоподібної залози, зокрема його поширення на такі органи, як легені та кістки.
Більше того, SW-1736 використовували для дослідження потенційних стратегій лікування, включаючи комбіноване застосування метформіну зі стандартними хіміотерапевтичними препаратами, такими як етопозид та епірубіцин. Ці дослідження свідчать, що метформін підсилює цитотоксичну дію цих препаратів, збільшуючи індукцію апоптозу та некрозу в клітинах SW-1736. Ця комбінована терапія показала перспективність у зменшенні міграції та проліферації ракових клітин, потенційно відкриваючи нові терапевтичні можливості для боротьби з агресивними формами раку щитоподібної залози.

Тканина	Тиреоїдемія
Хвороба	Плоскоклітинний рак

Синоніми

- SW1736
- SW 1736

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Жінка
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Епітеліальноподібні

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

SW-1736 (каталожний номер 300453)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606

Целозавр	CVCL_3883

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Профіль мутацій

Мутація V600E типу BRAF

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

RPMI 1640, w: 2,0 мМ стабільний глютамін, w: 2,0 г/л NaHCO3 (номер за каталожним номером 820700a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Оновлення рідини	2-3 рази на тиждень

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	77 років
Етнічна приналежність	Кавказець

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes