H9 (derivative of HuT 78)

300460

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

Клетъчната линия H9, получена от клоново производно на Т-клетъчната линия HUT 78 от възрастен пациент със синдрома на Сезари, притежава специфични клинични характеристики, които я правят изключително подходяща за изследвания на ХИВ. Тя е особено възприемчива за репликацията на HIV-1, което улеснява изолирането и размножаването на HIV-1 от кръвта на пациенти със СПИН и в състояние преди СПИН. Тази особеност подчертава полезността му за изучаване на вирусното поведение и тестване на антивирусни стратегии при различни клинични сценарии.
Кариотипно H9 е почти триплоиден с модален брой хромозоми 69, вариращ от 58 до 74, и показва 2,5% честота на по-високи плоиди. Клетъчната линия показва изключително сложен кариотип, като почти 60 % от хромозомите в клетка се състоят от структурно променени маркерни хромозоми, включително транслокации като t(3p4q), t(5q6q), t(5p6p) и делеции като del(7)(q32). Такива хромозомни аномалии допринасят за уникалния генетичен профил на линията, като оказват влияние върху поведението и отговора ѝ към вирусни инфекции. Липсата на нормални хромозоми N4, N5, N6, N7, N10, N13, N18, N19, N20 и X допълнително отличава генетичния състав на линията.
Освен това клетъчната линия H9 е туморогенна по природа, което се доказва от успешното подкожно образуване на тумори в голи мишки при инокулиране с 10(7) клетки. Тя експресира редица антигени, включително CD4 и различни човешки левкоцитни антигени (HLA) като A1, B62, C3, DR4 и DQ3, които играят критична роля в имунното разпознаване и отговор. Възприемчивостта му към HIV-1 и експресията на гени като интерлевкин-2 (IL-2) са от ключово значение за изследване на имунните реакции и вирусните взаимодействия, което превръща H9 в жизненоважен инструмент в областта на имунологичните и вирусологичните изследвания.

Тъкан	Кръв
Заболяване	Синдром на Сезари (агресивна форма на кожен Т-клетъчен лимфом)
Място на метастазите	Периферна кръв

Синоними

- HT clone H9
- HT(H9)
- H 9
- H-9

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Мъж
Свойства, свързани с растежа	Окачване
Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфология	Лимфобласт
Тип клетка	Т-клетка

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

H9 (дериват на HuT 78) (каталожен номер на Cytion 300460)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_1240

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Експресирани рецептори

CD4+

Експресия на протеини

Интерлевкин 2 (IL-2)

Изоензими

AK-1, 0, ES-D, 1, G6PD, B, GLO-I, 1, Me-2, 0, PGM1, 1, PGM3, 0

Податливост към вируси

HIV-1 (HTLV-III)

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

RPMI 1640, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w: 2,0 g/L NaHCO3 (номер на статията в Cytion 820700a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Допълнете средата с 10% FBS

Пресаждане

Нежно хомогенизирайте клетъчната суспензия в колбата, като я пипетирате нагоре и надолу, след което вземете представителна проба, за да определите клетъчната плътност на мл. Разредете суспензията, за да постигнете клетъчна концентрация от 1 x 10^5 клетки/мл с прясна културална среда, и разпределете коригираната суспензия в нови колби за по-нататъшно култивиране.

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	53 години
Етническа принадлежност	Европейски

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes