MEG-01

300482

معلومات عامة

الوصف

هو خط خلايا الأرومة النخاعية النخاعية البشرية الذي تم إنشاؤه من نخاع عظم مريض يبلغ من العمر 55 عاماً كان في مرحلة أزمة MEG-01 إن خط الخلايا تم تطوير هذا الخط الخلوي في عام 1983 في كلية الطب بجامعة ناغويا، اليابان. كان .(CML) الأرومة النخاعية النخاعية في سرطان الدم النقوي المزمن MEG-01 وهي سمة مميزة لسرطان الدم النخاعي المزمن. تُظهر خلايا (Ph1)، منه إيجابيًا بالنسبة لكروموسوم فيلادلفيا MEG-01 المريض الذي تم اشتقاق وهو نتيجة للانتقال Ph1، نمطاً كروموسومياً مفرط الازدواج الصبغي مع عدد كروموسومات نموذجي يتراوح بين 56 و58، ويظهر باستمرار وجود كروموسوم الصبغي t(9;22).

بخصائص نمو مختلطة، حيث تُظهر خصائص ملتصقة ومعلقة في المزرعة. وتعبر هذه الخلايا عن العديد من العلامات والمستضدات MEG-01 تتميز خلايا كما أن اختبارها إيجابي بالنسبة إلى العامل الثامن السيتوبلازمي والسطحي .CDw14وCD61وCD41 المميزة لسلالة النخاع الشوكي النخاعي، بما في ذلك GPIIb/IIIa، وتفاعل حمض ألفا نفثيل أسيتات استريز وفوسفاتيز الحمض. ومن المثير (PAS) والعديد من الأنشطة الأنزيمية مثل تفاعل حمض شيف الدوري وإستريز AS-D سلبية بالنسبة إلى إنزيمات نافثيل بيروكسيديز وإستريز ألفا نافثيل بوتيرات وإستريز كلورواسيتات النفثول MEG-01 للاهتمام أن خلايا كلورواسيتات والفوسفاتاز القلوي، مما يساعد على تمييزها عن الخلايا النخاعية الأخرى.

نموذجاً قيماً لدراسة تكوّن النخاع النخاعي البشري وإنتاج الصفائح الدموية والتخليق الحيوي للبروتينات الفريدة من نوعها في سلالة النخاع MEG-01 لقد كان ونظراً لخلفيته الوراثية المميّزة وقدرته على التعبير .GPIIb/IIIa والبروتينات السكرية مثل (PDGF) النخاعي، مثل عامل النمو المشتق من الصفائح الدموية يُستخدم كأداة مهمة في التحقيق في سرطان الدم وآليات التكوّن الحيوي للصفائح الدموية، على الرغم MEG-01 عن علامات الخلايا النخاعية الرئيسية فإن من أنه غير مخصص للتطبيقات العلاجية أو في الجسم الحي.

الأنسجة	النخاع العظمي
المرض	ابيضاض الدم النخاعي المزمن

المرادفات

- Meg-01
- MEG01
- Meg01

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	ذكر
خصائص النمو	التثبيت والتعليق
مستوى السلامة البيولوجية	1

الخصائص

المورفولوجيا	شبيه بالأرومة العضلية
نوع الخلية	ميجاكاريوبلاست

المعرّفات

المرجع

MEG-01 (كتالوج سيتيون رقم 300482)

رقم التعريف الضريبي لدى NCBI	9606
سيلوصور	CVCL_0425

التعبير والقابلية للإصابة

التعبير عن المستضد

CD41 +، CD61 +، CDW14 +، CDW14 +

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

RPMI 1640، ت: 2.0 جم/لتر NaHCO3 (820700 رقم المادة aمن سايتيون) ث: 2.0 مللي مولار جلوتامين مستقر،

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

قم بتزويد الوسط ب 10٪ من ال FBS

كاشف التفكك	أكوتاس

إعادة الاستنبات

استخدم 3-5 مل لقوارير) الذي يفتقر إلى الكالسيوم والمغنيسيوم PBS اجمع الخلايا المعلقة في أنبوب سعة 15 مل واغسل الخلايا الملتصقة برفق باستخدام لضمان تغطية كاملة لطبقة الخلايا. اسمح للخلايا بالاحتضان في درجة (T75 و2.5 مل لقوارير، T25 1-2 مل لقوارير) ضع أكوتاز .(T75 و5-10 مل لقوارير T25 حرارة الغرفة لمدة 10 دقائق. بعد الحضانة، اخلط كل من الخلايا المعلقة والخلايا الملتصقة واطردها مركزيًا. بعد الطرد المركزي، يُعاد بعناية إعادة ترسيب كريات الخلايا بعناية ونقل المعلق الخلوي إلى قوارير جديدة تحتوي على وسط جديد.

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزمويبروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

عمر المتبرع	سنة 55
الأصل العرقي	شرق آسيا

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

في Cytion، نلتزم Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB