MEG-01

300482

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

MEG-01-cellelinjen er en human megakaryoblast-cellelinje, der er etableret fra knoglemarven hos en 55-årig mandlig patient, som var i den megakaryoblastiske krisefase af kronisk myelogen leukæmi (CML). Denne cellelinje blev udviklet i 1983 på Nagoya University School of Medicine i Japan. Den patient, som MEG-01 stammer fra, var positiv for Philadelphia-kromosomet (Ph1), som er et kendetegn for CML. MEG-01-cellerne udviser en hyperdiploid karyotype med et modalt kromosomtal på 56 til 58, hvilket konsekvent viser tilstedeværelsen af Ph1-kromosomet, som er et resultat af den kromosomale translokation t(9;22).
MEG-01-celler har blandede vækstegenskaber og udviser både adhærente og suspenderede egenskaber i kultur. Disse celler udtrykker flere markører og antigener, der er karakteristiske for den megakaryocytiske linje, herunder CD41, CD61 og CDw14. De tester også positivt for cytoplasmatisk faktor VIII, overflade GPIIb/IIIa og forskellige enzymatiske aktiviteter såsom periodisk syre-Schiff (PAS)-reaktion, alfa-naphthylacetatesterase og syrephosphatase. Interessant nok er MEG-01-celler negative for myeloperoxidase, alfa-naphthylbutyratesterase, naphthol AS-D-chloracetatesterase og alkalisk fosfatase, hvilket er med til at adskille dem fra andre myeloide celler.
MEG-01 har været en værdifuld model til at studere human megakaryopoiese, blodpladeproduktion og biosyntese af proteiner, der er unikke for den megakaryocytiske linje, såsom blodpladeafledt vækstfaktor (PDGF) og glykoproteiner som GPIIb/IIIa. På grund af sin velkarakteriserede genetiske baggrund og sin evne til at udtrykke vigtige megakaryocytmarkører fungerer MEG-01 som et vigtigt værktøj i undersøgelsen af leukæmi og blodpladebiogenesemekanismer, selv om det ikke er beregnet til terapeutiske eller in vivo-anvendelser.

Væv	Knoglemarv
Sygdom	Kronisk myeloid leukæmi

Synonymer

- Meg-01
- MEG01
- Meg01

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Mand
Vækstegenskaber	Adhæsion og suspension
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Myoblast-lignende
Celletype	Megakaryoblast

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

MEG-01 (Cytion katalognummer 300482)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0425

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Antigenudtryk

CD41 +, CD61 +, CDw14 +

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Saml de suspenderede celler i et 15 ml rør, og vask forsigtigt de klæbende celler med PBS uden calcium og magnesium (brug 3-5 ml til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber). Påfør Accutase (1-2 ml til T25-kolber, 2,5 ml til T75-kolber) for at sikre fuld dækning af cellelaget. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 10 minutter. Efter inkubationen kombineres og centrifugeres både suspensionen og de vedhæftede celler. Efter centrifugering resuspenderes cellepelleten forsigtigt, og cellesuspensionen overføres til nye kolber, der indeholder frisk medium.

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	55 år
Etnisk tilhørsforhold	Østasiatisk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytіon står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes