MEG-01

300482

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

A linha celular MEG-01 é uma linha celular de megacarioblastos humanos estabelecida a partir da medula óssea de um doente do sexo masculino de 55 anos de idade que se encontrava na fase de crise megacarioblástica da Leucemia Mielogénica Crónica (LMC). Esta linha celular foi desenvolvida em 1983 na Faculdade de Medicina da Universidade de Nagoya, Japão. O doente do qual a MEG-01 foi derivada era positivo para o cromossoma Filadélfia (Ph1), uma caraterística distintiva da LMC. As células MEG-01 apresentam um cariótipo hiperdiplóide com um número cromossómico modal de 56 a 58, mostrando consistentemente a presença do cromossoma Ph1, que resulta da translocação cromossómica t(9;22).
As células MEG-01 têm propriedades de crescimento mistas, demonstrando tanto caraterísticas aderentes como de suspensão em cultura. Estas células expressam vários marcadores e antigénios caraterísticos da linhagem megacariocítica, incluindo CD41, CD61 e CDw14. Também apresentam resultados positivos para o Fator VIII citoplasmático, GPIIb/IIIa de superfície e várias actividades enzimáticas, como a reação de ácido periódico de Schiff (PAS), a alfa naftil acetato esterase e a fosfatase ácida. É interessante notar que as células MEG-01 são negativas para mieloperoxidase, alfa naftil butirato esterase, naftol AS-D cloroacetato esterase e fosfatase alcalina, o que ajuda a distingui-las de outras células mieloides.
A MEG-01 tem sido um modelo valioso para estudar a megacariopoiese humana, a produção de plaquetas e a biossíntese de proteínas exclusivas da linhagem megacariocítica, como o fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF) e glicoproteínas como a GPIIb/IIIa. Devido ao seu fundo genético bem caracterizado e à sua capacidade de expressar marcadores chave dos megacariócitos, o MEG-01 serve como uma ferramenta importante na investigação da leucemia e dos mecanismos de biogénese plaquetária, embora não se destine a aplicações terapêuticas ou in vivo.

Tecido	Medula óssea
Doença	Leucemia mieloide crónica

Sinónimos

- Meg-01
- MEG01
- Meg01

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Masculino
Propriedades de crescimento	Adesão e suspensão
Nível de biossegurança	1

CARACTERÍSTICAS

Morfologia	Tipo mioblasto
Tipo de célula	Megacarioblasto

IDENTIFICADORES

Referência

MEG-01 (número de catálogo Cytion 300482)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0425

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Expressão do antígeno

CD41 +, CD61 +, CDw14 +

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

RPMI 1640, com: 2,0 mM de glutamina estável, com: 2,0 g/L NaHCO3 (número de artigo Cytion 820700a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS

Reagente de dissociação	Accutase

Subcultura

Reunir as células em suspensão num tubo de 15 ml e lavar suavemente as células aderentes com PBS sem cálcio e magnésio (utilizar 3-5 ml para os frascos T25 e 5-10 ml para os frascos T75). Aplicar Accutase (1-2 ml para os frascos T25, 2,5 ml para os frascos T75), assegurando a cobertura total da camada celular. Deixar as células incubar à temperatura ambiente durante 10 minutos. Após a incubação, combinar e centrifugar tanto a suspensão como as células aderentes. Após a centrifugação, ressuspender cuidadosamente o pellet de células e transferir a suspensão de células para novos frascos com meio fresco.

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	55 anos
Etnia	Ásia Oriental

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes