MEG-01

300482

GENERAL INFORMATION

Description

A linhagem celular MEG-01 é uma linhagem de megacarioblastos humanos estabelecida a partir da medula óssea de um paciente do sexo masculino de 55 anos que se encontrava na fase de crise megacarioblástica da leucemia mielóide crônica (LMC). Essa linha celular foi desenvolvida em 1983 na Faculdade de Medicina da Universidade de Nagoya, no Japão. O paciente do qual a MEG-01 foi derivada apresentava o cromossomo Filadélfia (Ph1), uma característica marcante da LMC. As células MEG-01 apresentam um cariótipo hiperdiplóide com um número modal de cromossomos de 56 a 58, demonstrando consistentemente a presença do cromossomo Ph1, que é resultado da translocação cromossômica t(9;22).
As células MEG-01 apresentam propriedades de crescimento mistas, demonstrando características tanto de adesão quanto de suspensão em cultura. Essas células expressam vários marcadores e antígenos característicos da linhagem megacariocítica, incluindo CD41, CD61 e CDw14. Elas também apresentam resultados positivos para o fator VIII citoplasmático, GPIIb/IIIa de superfície e várias atividades enzimáticas, como a reação de ácido periódico de Schiff (PAS), a alfa-naftilacetatoesterase e a fosfatase ácida. Curiosamente, as células MEG-01 apresentam resultados negativos para mieloperoxidase, alfa-naftilbutiratoesterase, naftol AS-D cloroacetatoesterase e fosfatase alcalina, o que ajuda a distingui-las de outras células mieloides.
O MEG-01 tem sido um modelo valioso para o estudo da megacariopoiese humana, da produção de plaquetas e da biossíntese de proteínas exclusivas da linhagem megacariocítica, como o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e glicoproteínas como a GPIIb/IIIa. Devido ao seu background genético bem caracterizado e à sua capacidade de expressar marcadores-chave dos megacariócitos, o MEG-01 serve como uma ferramenta significativa na investigação dos mecanismos da leucemia e da biogênese plaquetária, embora não se destine a aplicações terapêuticas ou in vivo.

Tissue	Medula óssea
Disease	Leucemia mielóide crônica

Synonyms

- Meg-01
- MEG01
- Meg01

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent and suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	semelhante a mioblastos
Cell type	Megacarioblasto

IDENTIFIERS

Citation

MEG-01 (número de catálogo da Cytion 300482)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0425

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Antigen expression

CD41+, CD61+, CDw14+

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, com 2,0 mM de glutamina estável e 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artigo da Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione 10% de FBS ao meio

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Recolha as células em suspensão em um tubo de 15 ml e lave delicadamente as células aderentes com PBS sem cálcio e magnésio (use 3 a 5 ml para frascos T25 e 5 a 10 ml para frascos T75). Aplique Accutase (1 a 2 ml para frascos T25, 2,5 ml para frascos T75), garantindo a cobertura total da camada celular. Deixe as células incubarem à temperatura ambiente por 10 minutos. Após a incubação, combine e centrifugue tanto a suspensão quanto as células aderentes. Após a centrifugação, ressuspenda cuidadosamente o sedimento celular e transfira a suspensão celular para novos frascos contendo meio fresco.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	55 anos
Ethnicity	do Leste Asiático

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes