NCI-H1299

300485

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

NCI-H1299, známa aj ako H1299, je ľudská bunková línia nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC), ktorá bola izolovaná z metastázy v lymfatických uzlinách dospelého mužského pacienta s karcinómom pľúc. Spolu s bunkami H292 sa H1299 široko využíva ako model NSCLC vo výskume biológie rakoviny a imuno-onkológie. Bunková línia vykazuje epiteliálnu morfológiu charakterizovanú adhezívnymi, sploštenými bunkami s hrúbkou menšou ako 5 µm a približným zdvojnásobením za 22–30 hodín. Bunky H1299 exprimujú keratín a vimentín, ale sú negatívne na neurofilamentový tripletový proteín, čo odráža fenotyp s epiteliálnymi aj mezenchýmovými charakteristikami.
Z genetického hľadiska bunky H1299 obsahujú homozygotnú čiastočnú deléciu v géne TP53, čo má za následok úplnú stratu expresie proteínu p53. Táto línia sa vyznačuje aj divokým typom KRAS, čím sa odlišuje od iných modelov NSCLC, ako sú bunky A549, ktoré nesú endogénne mutácie KRAS. Vzhľadom na absenciu funkčnej p53 signalizácie v kombinácii s intaktným KRAS sa bunky H1299 často používajú na štúdium biológie tumorových supresorov, onkogénnych signálnych dráh, apoptózy, metastázovania a mechanizmov terapeutickej rezistencie. V porovnaní s viac epiteliálnymi bunkovými líniami NSCLC, ako sú A549, bunky H1299 vykazujú viac mezenchýmový fenotyp so zníženou expresiou epiteliálnych markerov, čo ich robí obzvlášť užitočnými pre výskum epiteliálno-mezenchýmovej transformácie (EMT), invázie a metastatického progresu.
Bolo tiež zaznamenané, že bunky H1299 syntetizujú neuropeptid neuromedín B (NMB) v nízkych hladinách, pričom nemajú zistiteľnú produkciu peptidu uvoľňujúceho gastrín (GRP). Ich robustné rastové charakteristiky, vysoká transfekovateľnosť a dobre charakterizované molekulárne pozadie prispeli k ich širokému využitiu v štúdiách týkajúcich sa cielených terapií, úpravy génov, imunitou sprostredkovanej cytotoxicity a nadväzujúcich signálnych dráh spojených s KRAS. Rovnako ako pri všetkých modeloch nádorových buniek kultivovaných dlhodobo, odporúča sa pravidelné overovanie a potvrdzovanie kľúčových molekulárnych vlastností, aby sa zabezpečila reprodukovateľnosť experimentov.

Tkanivo	Pľúca
Choroba	Karcinóm

Synonymá

- H1299
- H-1299
- NCIH1299

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

NCI-H1299 (katalógové číslo Cytion 300485)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0060

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % FBS, pridajte 2,5 g/l glukózy a 10 mM HEPES

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmnožovanie kultúr

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Obnova kvapaliny	2 až 3-krát týždenne

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	59 rokov

Etnická príslušnosť	Kaukazský

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes