# Panc 10.05

300599

## GENERAL INFORMATION

### Description

בבני אדם, המשמש במחקרים הבוחנים את הביולוגיה של סרטן הלבלב ואת (PDAC) הוא קו תאים של אדנוקרצינומה של הלבלב Panc 10.05 קו התאים משמשים לעתים קרובות במחקרים המתמקדים בהבנת הסביבה Panc 10.05 תאי ,PDAC ההתערבויות הטיפוליות האפשריות. כמו קווי תאים אחרים של שימש לבחינת ,HPAF-II-ו BxPC-3 המיקרו-סביבתית של הגידול, התפשטות תאי הסרטן ומנגנוני העמידות לכימותרפיה. קו תאים זה, יחד עם אחרים כגון מפגין פעילות אנטי-פרוליפרטיבית DFX מחקרים הראו כי deferasirox (DFX) ההשפעות של חומרים חדשים נגד סרטן, כולל חומרים קושרים ברזל כגון S. על ידי גרימת אפופטוזיס ועצירת מחזור התא בשלב Panc 10.05 תלוית מינון נגד תאי
Panc 10.05 שימש גם לחקר תפקידם של דלקת וויסות חיסוני בסרטן הלבלב. לדוגמה, במודלים של תרבית משותפת עם מקרופאגים, תאי NLRP3 inflammasome-ויצרו מיקרו-סביבה פרו-דלקתית. אינטראקציה זו מובילה להפעלת ה ,(TAMs) הראו אינטראקציה עם מקרופאגים הקשורים לגידול הוכח MCC950 על ידי מעכבים ספציפיים כמו NLRP3 inflammasome-הממלא תפקיד קריטי בקידום צמיחת הגידול ובהימנעות ממערכת החיסון. עיכוב ה כמפחית את התגובה הציטוקינית הפרו-דלקתית ואת התרבות תאי הגידול, מה שמדגיש את הפוטנציאל שלו כיעד טיפולי.
משמש מודל חזק לחקר ההשפעות הישירות של חומרים טיפוליים והאינטראקציות המורכבות בתוך הסביבה המיקרו- Panc 10.05 בסך הכל, קו התאים סביבתית של הגידול בסרטן הלבלב, ומסייע בפיתוח אסטרטגיות טיפול חדשות למחלה אגרסיבית זו.

| | |
|---|---|
| **Tissue** | לבלב |
| **Disease** | אדנוקרצינומה של צינור הלבלב |

### Applications

תרבות תאים תלת-ממדית, מחקר סרטן

### Synonyms

- Panc-10.05
- Panc10.05
- PANC-10-05
- PANC 1005
- PANC1005
- Panc1005
- Pa16C
- PL12
- PL-12

## CLASSIFICATION

| | |
|---|---|
| **Organism** | Human |
| **Sex** | Male |
| **Growth properties** | Adherent |
| **Biosafety level** | 1 |

## CHARACTERISTICS

| | |
|---|---|
| **Morphology** | אפיתל |
| **Cell type** | תא אפיתל |
| **Tumourigenic** | כן, יוצר גידולים בעכברים עירומים או SCID |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## IDENTIFIERS

**Citation**

Panc 10.05 (מספר קטלוגי Cytion 300599)

| | |
|---|---|
| **NCBI TaxID** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_1639 |

## EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

**Protein expression**

ציטוקראטין 18, ציטוקראטין 7

**Antigen expression**

MHC סוג I +, MHC סוג II -

**Oncogenes**

K-ras+

## HANDLING AND CULTURE

**Culture medium**

RPMI 1640, w: 2.0 mM גלוטמין יציב, w: 2.0 g/L NaHCO3 (מספר קטלוגי של Cytion 820700a)

| | |
|---|---|
| **Incubation atmosphere** | 37°C, 5%CO2, אווירה לחה. |

**Supplements**

מנוטרל בחום, 10 יחידות/מ"ל אינסולין רקומביננטי אנושי FBS הוסף לתמיסה 20%

| | |
|---|---|
| **Dissociation reagent** | אקוטאז |

**Subculturing**

T75, השתמש ב-3-5 מ"ל PBS, ועבור בקבוקי T25, ללא סידן ומגנזיום. עבור בקבוקי PBS-הסר את המדיום הישן מהתאים הדבוקים ושטוף אותם ב
השאר את .T75 ו-2.5 מ"ל עבור בקבוקי T25 תוך שימוש ב-1-2 מ"ל עבור בקבוקי ,Accutase-השתמש ב-5-10 מ"ל. לאחר מכן, כסה את התאים לחלוטין ב
התאים לדגירה בטמפרטורת החדר למשך 8-10 דקות כדי לנתק אותם. לאחר הדגירה, ערבב בעדינות את התאים עם 10 מ"ל של מדיום כדי להחזיר אותם
למשך 3 דקות. השלך את הנוזל העליון, החזר את התאים לתמיסה במדיום טרי והעבר אותם לצלחות חדשות xgלתמיסה, ואז סובב בצנטריפוגה ב-300
.שכבר מכילות מדיום טרי

**Thawing and culturing**

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

**Sterility**

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
.כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות

| | |
|---|---|
| **Freeze medium** | כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו- ,(Cytion 800100 מספר קטלוגי) CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה. |

**Storage conditions**

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

**Shipping conditions**

במהלך -Cשורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78°. ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

## DONOR

| | |
|---|---|
| **Donor age** | שנים 81 |
| **Ethnicity** | אירופאי |

## LEGAL AND SAFETY

**Safety precautions**

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

**Warranty**

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
הצהרת האחריות שלנו<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">

| | |
|---|---|
| **Material Transfer Agreement required** | Yes |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB