Panc 10.05

300599

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

A Panc 10.05 sejtvonal egy humán hasnyálmirigy ductus adenokarcinóma (PDAC) sejtvonal, amelyet a hasnyálmirigyrák biológiáját és a lehetséges terápiás beavatkozásokat vizsgáló tanulmányokban használnak. Más PDAC-sejtvonalakhoz hasonlóan a Panc 10.05 sejteket is gyakran használják a tumor mikrokörnyezetének, a rákos sejtek proliferációjának és a kemoterápiával szembeni rezisztencia mechanizmusainak megértésére irányuló kutatásokban. Ezt a sejtvonalat, más sejtvonalakkal együtt, mint például a BxPC-3 és a HPAF-II, új rákellenes szerek, köztük a vas kelátorok, például a deferasirox (DFX) hatásának tesztelésére használták. A vizsgálatok kimutatták, hogy a DFX dózisfüggő antiproliferatív hatást fejt ki a Panc 10.05 sejtekkel szemben azáltal, hogy apoptózist indukál és megállítja a sejtciklust az S-fázisban.
A Panc 10.05-öt a gyulladás és az immunmoduláció hasnyálmirigyrákban betöltött szerepének feltárására is felhasználták. Például makrofágokkal együtt tenyésztett modellekben kimutatták, hogy a Panc 10.05 sejtek kölcsönhatásba lépnek a tumorhoz kapcsolódó makrofágokkal (TAM-ok), pro-inflammatorikus mikrokörnyezetet hozva létre. Ez a kölcsönhatás az NLRP3 inflammaszóma aktiválásához vezet, amely kritikus szerepet játszik a tumor növekedésének és az immunrendszer kijátszásának elősegítésében. Az NLRP3 inflammaszóma gátlása specifikus inhibitorokkal, mint például az MCC950, bizonyítottan csökkenti a pro-inflammatorikus citokinválaszt és a tumorsejtek proliferációját, ami rávilágít a terápiás célpontként való potenciáljára.
Összességében a Panc 10.05 sejtvonal robusztus modellként szolgál mind a terápiás szerek közvetlen hatásainak, mind a hasnyálmirigyrák tumoros mikrokörnyezetén belüli komplex kölcsönhatások tanulmányozására, segítve ezzel az agresszív betegség új kezelési stratégiáinak kifejlesztését.

Szövet	Hasnyálmirigy
Betegség	Hasnyálmirigy ductus adenokarcinóma

Alkalmazások

3D sejtkultúra, rákkutatás

Szinonimák

- Panc-10.05
- Panc10.05
- PANC-10-05
- PANC 1005
- PANC1005
- Panc1005
- Pa16C
- PL12
- PL-12

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Férfi
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Epithelialis

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Sejttípus	Epithelsejt
Daganatképző	Igen, daganatokat képez meztelen vagy SCID egerekben

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

Panc 10.05 (Cytion katalógusszám: 300599)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_1639

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Fehérjeexpresszió

Cytokeratin 7, cytokeratin 18

Antigén-expresszió

MHC I. osztály +, MHC II. osztály -

Onkogének

K-ras+

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion 820700a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt 20% hő inaktivált FBS-szel, 10 egység/mL humán rekombináns inzulinnal egészítsük ki

Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	81 év
Etnikai hovatartozás	Európai

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes