Panc 10.05

300599

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

Panc 10.05-cellelinjen er en human cellelinje fra pankreatisk duktalt adenokarsinom (PDAC), som brukes i studier som utforsker biologien til kreft i bukspyttkjertelen og potensielle terapeutiske intervensjoner. I likhet med andre PDAC-cellelinjer brukes Panc 10.05-celler ofte i forskning som fokuserer på å forstå tumormikromiljøet, kreftcellenes spredning og mekanismer for resistens mot kjemoterapi. Denne cellelinjen, sammen med andre cellelinjer som BxPC-3 og HPAF-II, har blitt brukt til å teste effekten av nye kreftmidler, blant annet jernchelatorer som deferasirox (DFX). Studier har vist at DFX har en doseavhengig antiproliferativ aktivitet mot Panc 10.05-celler ved å indusere apoptose og stanse cellesyklusen i S-fasen.
Panc 10.05 har også blitt brukt til å utforske hvilken rolle inflammasjon og immunmodulering spiller i bukspyttkjertelkreft. I samkulturmodeller med makrofager har det for eksempel vist seg at Panc 10.05-celler interagerer med tumorassosierte makrofager (TAM), noe som skaper et proinflammatorisk mikromiljø. Denne interaksjonen fører til aktivering av NLRP3-inflammasomet, som spiller en avgjørende rolle i å fremme tumorvekst og immunundvikelse. Inhibering av NLRP3-inflammasomet ved hjelp av spesifikke hemmere som MCC950 har vist seg å redusere den proinflammatoriske cytokinresponsen og tumorcelleproliferasjon, noe som understreker dets potensial som et terapeutisk mål.
Alt i alt fungerer Panc 10.05-cellelinjen som en robust modell for å studere både de direkte effektene av terapeutiske midler og de komplekse interaksjonene i tumormikromiljøet ved bukspyttkjertelkreft, noe som kan bidra til utviklingen av nye behandlingsstrategier for denne aggressive sykdommen.

Vev	Bukspyttkjertelen
Sykdom	Adenokarsinom i bukspyttkjertelen

Søknader

3D-cellekultur, Kreftforskning

Synonymer

- Panc-10.05
- Panc10.05
- PANC-10-05
- PANC 1005
- PANC1005
- Panc1005
- Pa16C
- PL12
- PL-12

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Tilhenger
Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Epitelial
Celletype	Epitelcelle

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tumorinduserende	Ja, danner svulster i nakenmus eller SCID-mus

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

Panc 10.05 (Cytion katalognummer 300599)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1639

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Proteinekspresjon

Cytokeratin 7, cytokeratin 18

Antigenuttrykk

MHC klasse I +, MHC klasse II -

Onkogener

K-ras+

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820700a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 20 % varmeinaktivert FBS, 10 enheter/ml humant rekombinant insulin

Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Subkultivering

Fjern det gamle mediet fra de adherente cellene, og vask dem med PBS uten kalsium og magnesium. Bruk 3-5 ml PBS for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber. Dekk deretter cellene helt med Accutase, med 1-2 ml for T25-kolber og 2,5 ml for T75-kolber. La cellene inkubere i romtemperatur i 8-10 minutter for å løsne dem. Etter inkubasjon blandes cellene forsiktig med 10 ml medium for å resuspendere dem, og sentrifuger deretter ved 300xg i 3 minutter. Kast supernatanten, resuspender cellene i nytt medium, og overfør dem til nye kolber som allerede inneholder nytt medium.

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	81 år
Etnisitet	Europeisk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes