SUM149PT

300609

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

SUM149PT-solulinja on peräisin ihmisen tulehduksellisesta rintasyövästä (IBC), joka edustaa rintasyövän aggressiivista alatyyppiä. IBC:lle on ominaista nopea eteneminen, varhainen etäpesäkkeiden muodostuminen ja huono ennuste. SUM149PT-solut luokitellaan kolmoisnegatiiviseksi rintasyöväksi (TNBC), sillä niistä puuttuu estrogeenireseptorin (ER), progesteronireseptorin (PR) ja HER2-reseptorin ilmentyminen, minkä vuoksi ne eivät reagoi tavanomaisiin kohdennettuihin hoitoihin, kuten hormonihoitoihin tai HER2-estäjiin. Sen sijaan tällaisten syöpien hoitoon kuuluu yleensä sytotoksinen kemoterapia, vaikka näille syöville kehittyy usein ajan myötä resistenssi.
Merkittävää on, että SUM149PT-soluissa on 2288delT BRCA1-mutaatio, joka johtaa BRCA1:n toiminnan menetykseen. Tämä mutaatio on frame-shift-deleetio, joka johtaa BRCA1-proteiinin ennenaikaiseen päättymiseen, mikä heikentää DNA:n korjausta ja edistää genomista epävakautta, joka on BRCA1-mutaation omaavien syöpien tunnusmerkki. BRCA1:n menetys vaikuttaa osaltaan SUM149PT:ssä havaittuun lisääntyneeseen kromosomisen epävakauteen, jossa esiintyy lukuisia kromosomipoikkeavuuksia. Mutaation lisäksi BRCA1-lokus on kadonnut SUM149PT:ssä, mikä pahentaa vaikutusta genomistabiilisuuteen entisestään.
Yllättäen SUM149PT-soluissa esiintyy CD44+/CD24-/Low stem-like -syöpäsolujen osapopulaatiota, jossa on runsaasti syöpäkantasolun (CSC) ominaisuuksia, kuten lisääntynyt invaasio, kasvainten synty ja resistenssi kemoterapiaa vastaan. Näihin kantasolujen kaltaisiin soluihin liittyy myös sentrosomin monistuminen ja kohonnut sykliini E/Cdk2-aktiivisuus. Cdk2:n estäminen SUM149PT:ssä kohdistuu valikoivasti tähän CSC-alipopulaatioon ja palauttaa jonkin verran herkkyyttä kemoterapialle, mikä viittaa siihen, että yhdistetyt terapeuttiset strategiat, jotka kohdistuvat Cdk2:een ja tavanomaiseen kemoterapiaan, saattavat olla tehokkaita kemoresistenttien IBC-solujen hoidossa.

Kudos	Rinta
Sairaus	Rintojen tulehduksellinen karsinooma

Synonyymit

- SUM-149PT
- SUM 149PT
- SUM149-PT
- SUM149
- SUM-149
- SUM 149
- 149 PT
- 149PT
- BrCL12

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Nainen
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt

OMINAISUUDET

Morfologia	Epiteeli

TUNNISTEET

Lähdeviite

SUM149PT (Cytionin luettelonumero 300609)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_3422

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Proteiinin ilmentyminen

P53-positiivinen

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

Ham's F12, w: 1,0 mM stabiilia glutamiinia, w: 1,0 mM natriumpyruvaattia, w: 1,1 g/L NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820600a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Accutase

Soluviljely

Poista vanha väliaine tarttuneista soluista ja pese ne PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia. Käytä T25-pulloissa 3-5 ml PBS:ää ja T75-pulloissa 5-10 ml. Peitä sitten solut kokonaan Accutase-valmisteella, käyttäen 1-2 ml T25-pulloissa ja 2,5 ml T75-pulloissa. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 8-10 minuuttia solujen irtoamiseksi. Inkuboinnin jälkeen solut sekoitetaan varovasti 10 ml:n väliaineella niiden resuspendoimiseksi ja sentrifugoidaan sitten 300xg:n nopeudella 3 minuutin ajan. Hävitä supernatantti, suspendoi solut uudelleen tuoreeseen väliaineeseen ja siirrä ne uusiin pulloihin, jotka sisältävät jo tuoretta väliaineita.

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	40 vuotta

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes