# SUM149PT

300609

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

### Leírás

A SUM149PT sejtvonal humán gyulladásos emlőrákból (IBC) származik, amely az emlőrák agresszív altípusát képviseli. Az IBC-t gyors progresszió, korai áttétképződés és rossz prognózis jellemzi. A SUM149PT sejtek a tripla-negatív emlőrák (TNBC) kategóriájába tartoznak, mivel nem expresszálódnak az ösztrogénreceptor (ER), a progeszteronreceptor (PR) és a HER2-receptor, így nem reagálnak az olyan gyakori célzott terápiákra, mint az endokrin kezelések vagy a HER2-gátlók. Ehelyett az ilyen rákok kezelése jellemzően citotoxikus kemoterápiát jelent, bár ezek a rákok idővel gyakran rezisztenciát fejlesztenek ki.
Jelentős, hogy a SUM149PT sejtek 2288delT BRCA1 mutációval rendelkeznek, ami a BRCA1 funkció elvesztéséhez vezet. Ez a mutáció egy frame-shift deléció, amely a BRCA1 fehérje idő előtti megszűnését eredményezi, károsítva a DNS-javítást és elősegítve a genomi instabilitást, ami a BRCA1-mutációval rendelkező rákok jellemzője. A BRCA1 elvesztése hozzájárul a SUM149PT-ben megfigyelt fokozott kromoszóma-instabilitáshoz, amely számos kromoszóma-rendellenességet mutat. A mutáción kívül a BRCA1-lokusz is elveszett a SUM149PT-ben, ami tovább súlyosbítja a genomi stabilitásra gyakorolt hatást.
Meglepő módon a SUM149PT sejtek CD44+/CD24-/Low őssejt-szerű rákos sejt alpopulációt mutatnak, amely olyan rákos őssejt (CSC) tulajdonságokkal gazdagodik, mint a fokozott invázió, tumorigenezis és kemoterápiával szembeni rezisztencia. Ezek az őssejt-szerű sejtek centroszóma-amplifikációval és emelkedett ciklin E/Cdk2 aktivitással is társulnak. A Cdk2 gátlása a SUM149PT-ben szelektíven ezt a CSC alpopulációt célozza, helyreállítva a kemoterápiával szembeni érzékenységet, ami arra utal, hogy a Cdk2-t és a hagyományos kemoterápiát célzó kombinált terápiás stratégiák hatékonyak lehetnek a kemorezisztens IBC kezelésében.

| | |
|---|---|
| **Szövet** | Mell |
| **Betegség** | Mell gyulladásos karcinóma |

### Szinonimák

- SUM-149PT
- SUM 149PT
- SUM149-PT
- SUM149
- SUM-149
- SUM 149
- 149 PT
- 149PT
- BrCL12

## OSZTÁLYOZÁS

| | |
|---|---|
| **Organizmus** | Ember |
| **Szex** | Nő |
| **Növekedési tulajdonságok** | Hűséges |

## JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| **Morfológia** | Epithelialis |

## AZONOSÍTÓK

### Hivatkozás

SUM149PT (Cytion katalógusszám: 300609)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

| | |
|---|---|
| **NCBI adóazonosító szám** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_3422 |

## KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

### Fehérjeexpresszió

P53 pozitív

## KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

### Táptalaj

Ham's F12, w: 1,0 mM stabil glutamin, w: 1,0 mM nátrium-piruvát, w: 1,1 g/L NaHCO3 (Cytion cikkszám 820600a)

| | |
|---|---|
| **Inkubációs környezet** | 37°C, 5%CO2, párásított légkör. |

### Kiegészítők

A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

| | |
|---|---|
| **Diszociációs reagens** | Accutase |

### Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

### Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

### Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

| | |
|---|---|
| **Fagyasztóközeg** | Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében. |

### Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

**Szállítási feltételek**

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

## ADOMÁNYOZÓ

| | |
|---|---|
| **Az adományozó életkora** | 40 év |

## JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

**Biztonsági óvintézkedések**

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

**Garancia**

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""'x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

| | |
|---|---|
| **Anyagátadási megállapodás szükséges** | Yes |