SUM149PT

300609

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Garis sel SUM149PT berasal dari karsinoma payudara inflamasi manusia (IBC), yang mewakili subtipe agresif kanker payudara. IBC ditandai dengan perkembangan yang cepat, metastasis dini, dan prognosis yang buruk. Sel SUM149PT diklasifikasikan sebagai kanker payudara triple-negatif (TNBC), tidak memiliki ekspresi reseptor estrogen (ER), reseptor progesteron (PR), dan reseptor HER2, sehingga tidak responsif terhadap terapi yang ditargetkan secara umum, seperti pengobatan endokrin atau penghambat HER2. Sebaliknya, pengobatan untuk kanker semacam itu biasanya melibatkan kemoterapi sitotoksik, meskipun kanker ini sering mengembangkan resistensi dari waktu ke waktu.
Secara signifikan, sel SUM149PT memiliki mutasi BRCA1 2288delT, yang menyebabkan hilangnya fungsi BRCA1. Mutasi ini adalah penghapusan pergeseran bingkai yang mengakibatkan penghentian dini protein BRCA1, merusak perbaikan DNA dan meningkatkan ketidakstabilan genom, yang merupakan ciri khas kanker yang bermutasi BRCA1. Hilangnya BRCA1 berkontribusi pada peningkatan ketidakstabilan kromosom yang diamati pada SUM149PT, yang menunjukkan banyak kelainan kromosom. Selain mutasi, lokus BRCA1 juga hilang pada SUM149PT, yang semakin memperparah dampaknya pada stabilitas genom.
Yang mengejutkan, sel SUM149PT menunjukkan subpopulasi sel kanker mirip batang CD44+/CD24-/Rendah, yang diperkaya dengan sifat sel punca kanker (CSC) seperti peningkatan invasi, tumorigenesis, dan resistensi terhadap kemoterapi. Sel-sel seperti batang ini juga dikaitkan dengan amplifikasi sentrosom dan peningkatan aktivitas cyclin E / Cdk2. Penghambatan Cdk2 dalam SUM149PT secara selektif menargetkan subpopulasi CSC ini, memulihkan beberapa sensitivitas terhadap kemoterapi, yang menunjukkan bahwa strategi terapi gabungan yang menargetkan Cdk2 dan kemoterapi konvensional mungkin efektif dalam mengobati IBC yang resisten terhadap kemoterapi.

Tisu	Payudara
Penyakit	Karsinoma inflamasi payudara

Sinonim

- SUM-149PT
- SUM 149PT
- SUM149-PT
- SUM149
- SUM-149
- SUM 149
- 149 PT
- 149PT
- BrCL12

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Perempuan
Sifat-sifat pertumbuhan	Pengikut

KARAKTERISTIK

Morfologi	Epitel

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

SUM149PT (Nomor katalog Cytion 300609)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_3422

EKSPRESI DAN KERENTANAN

Ekspresi protein

P53 positif

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

Ham's F12, w: 1,0 mM Glutamin stabil, w: 1,0 mM Natrium piruvat, w: 1,1 g/L NaHCO3 (Nomor artikel Cytion 820600a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Tambahkan media dengan 10% FBS

Reagen disosiasi	Accutase

Perbanyakan sel

Buang media lama dari sel yang melekat dan cuci dengan PBS yang tidak mengandung kalsium dan magnesium. Untuk labu T25, gunakan 3-5 ml PBS, dan untuk labu T75, gunakan 5-10 ml. Kemudian, tutupi sel sepenuhnya dengan Accutase, menggunakan 1-2 ml untuk labu T25 dan 2,5 ml untuk labu T75. Biarkan sel diinkubasi pada suhu kamar selama 8-10 menit untuk melepaskannya. Setelah inkubasi, campurkan sel secara perlahan dengan 10 ml medium untuk meresuspensi sel, kemudian sentrifugasi pada 300xg selama 3 menit. Buang supernatan, resuspensi sel dalam medium segar, dan pindahkan ke dalam labu baru yang sudah berisi medium segar.

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran. Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	40 tahun

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes