SUM149PT

300609

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

A linha celular SUM149PT é derivada de um carcinoma inflamatório da mama humano (IBC), que representa um subtipo agressivo de cancro da mama. O IBC caracteriza-se por uma progressão rápida, metástases precoces e um mau prognóstico. As células SUM149PT são classificadas como cancro da mama triplo-negativo (TNBC), não expressando o recetor de estrogénio (ER), o recetor de progesterona (PR) e o recetor HER2, o que faz com que não respondam a terapias direcionadas comuns, como tratamentos endócrinos ou inibidores HER2. Em vez disso, o tratamento para estes cancros envolve normalmente quimioterapia citotóxica, embora estes cancros desenvolvam frequentemente resistência ao longo do tempo.
É significativo o facto de as células SUM149PT possuírem uma mutação BRCA1 2288delT, que conduz a uma perda da função BRCA1. Esta mutação é uma deleção por deslocamento de quadro que resulta na terminação prematura da proteína BRCA1, prejudicando a reparação do ADN e promovendo a instabilidade genómica, uma caraterística distintiva dos cancros com mutações BRCA1. A perda de BRCA1 contribui para o aumento da instabilidade cromossómica observada no SUM149PT, que apresenta numerosas aberrações cromossómicas. Para além da mutação, o locus BRCA1 está perdido no SUM149PT, agravando ainda mais o impacto na estabilidade genómica.
Surpreendentemente, as células SUM149PT exibem uma subpopulação de células cancerígenas CD44+/CD24-/Low semelhantes a células estaminais, que é enriquecida em propriedades de células estaminais cancerígenas (CSC), tais como maior invasão, tumorigénese e resistência à quimioterapia. Estas células estaminais estão também associadas à amplificação dos centrossomas e a uma atividade elevada da ciclina E/Cdk2. A inibição de Cdk2 em SUM149PT visa seletivamente esta subpopulação de CSC, restaurando alguma sensibilidade à quimioterapia, o que sugere que estratégias terapêuticas combinadas visando Cdk2 e quimioterapia convencional poderão ser eficazes no tratamento de IBC quimiorresistente.

Tecido	Peito
Doença	Carcinoma inflamatório da mama

Sinónimos

- SUM-149PT
- SUM 149PT
- SUM149-PT
- SUM149
- SUM-149
- SUM 149
- 149 PT
- 149PT
- BrCL12

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Feminino
Propriedades de crescimento	Aderente

CARACTERÍSTICAS

Morfologia	Epitelial

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFICADORES

Referência

SUM149PT (número de catálogo Cytion 300609)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_3422

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Expressão proteica

P53 positivo

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

Ham's F12, com: 1,0 mM de glutamina estável, com: 1,0 mM de piruvato de sódio, com: 1,1 g/L NaHCO3 (número de artigo Cytion 820600a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS

Reagente de dissociação	Accutase

Subcultura

Retirar o meio antigo das células aderentes e lavá-las com PBS sem cálcio e magnésio. Nos frascos T25, utilizar 3-5 ml de PBS e nos frascos T75, 5-10 ml. Em seguida, cobrir completamente as células com Accutase, utilizando 1-2 ml para os frascos T25 e 2,5 ml para os frascos T75. Deixar as células incubar à temperatura ambiente durante 8-10 minutos para as destacar. Após a incubação, misturar suavemente as células com 10 ml de meio para as ressuspender e, em seguida, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Deitar fora o sobrenadante, ressuspender as células em meio fresco e transferi-las para novos frascos que já contenham meio fresco.

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	40 anos

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes