VCaP

300631

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Περιγραφή

Η κυτταρική σειρά VCaP (σπονδυλικός καρκίνος του προστάτη) είναι ένα σημαντικό μοντέλο για τη μελέτη του καρκίνου του προστάτη, που προέρχεται από σπονδυλική μετάσταση ανθρώπινου καρκινώματος του προστάτη. Δημιουργήθηκε για να παρέχει ένα σχετικό in vitro μοντέλο για την έρευνα της βιολογίας του καρκίνου του προστάτη και της μεταστατικής του διαδικασίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα ορμονοανθεκτικά στάδια της νόσου. Τα κύτταρα VCaP είναι γνωστό ότι εκφράζουν υψηλό επίπεδο ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) και υποδοχέα ανδρογόνων (AR), γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα σημαντικά για μελέτες σχετικά με τα μονοπάτια σηματοδότησης του υποδοχέα ανδρογόνων και τους μηχανισμούς αντίστασης στην αντιανδρογονική θεραπεία.
Τα κύτταρα VCaP χρησιμοποιούνται επίσης εκτενώς σε γενετικές μελέτες, καθώς φέρουν τη σύντηξη του γονιδίου TMPRSS2-ERG, μια κοινή χρωμοσωμική μετάθεση που απαντάται στο 50% περίπου των περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη. Η συγκεκριμένη γενετική μεταβολή είναι σημαντική, διότι θεωρείται ότι διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη. Τα κύτταρα αυτά αποτελούν επομένως ένα εξαιρετικό εργαλείο για την έρευνα με στόχο την κατανόηση των μοριακών υποβάθρων του καρκίνου του προστάτη και για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών που στοχεύουν στο TMPRSS2-ERG και σε συναφή μονοπάτια. Επιπλέον, τα κύτταρα VCaP παρουσιάζουν ισχυρή in vitro ανάπτυξη και μπορούν να σχηματίσουν όγκους όταν μεταμοσχεύονται σε ανοσοανεπαρκή ποντίκια, παρέχοντας ένα χρήσιμο σύστημα για προκλινικές μελέτες νέων αντικαρκινικών φαρμάκων.
Συνολικά, η κυτταρική σειρά VCaP χρησιμεύει ως ζωτικός πόρος για μοριακές και φαρμακολογικές μελέτες, συμβάλλοντας σημαντικά στην κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου του προστάτη και στην αξιολόγηση νέων θεραπευτικών παραγόντων. Τα χαρακτηριστικά της, συμπεριλαμβανομένης της ορμονικής ανταπόκρισης, της έκφρασης γονιδιακών συγχωνεύσεων και της μεταστατικής προέλευσης, την καθιστούν μοναδικά κατάλληλη για την προηγμένη έρευνα στον καρκίνο του προστάτη, ιδίως σε τομείς που σχετίζονται με την ανεξαρτησία από τα ανδρογόνα και την εξέλιξη της μεταστατικής νόσου.

Ιστός	Προστάτης
Ασθένεια	Καρκίνωμα του προστάτη
Θέση μετάστασης	Οστό, σπόνδυλος

Συνώνυμα

- VCAP
- Vcap
- Vertebral Cancer of the Prostate

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Οργανισμός	Άνθρωπος
Σεξ	Άνδρας
Ιδιότητες ανάπτυξης	Πιστός
Επίπεδο βιοασφάλειας	1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ογκογόνος	Ναι, σε ποντίκια SCID
Χρόνος διπλασιασμού	Αργά αναπτυσσόμενη κυτταρική σειρά, χρόνος διπλασιασμού 5-6 ημέρες.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ

Παραπομπή

VCaP (αριθμός καταλόγου Cytion 300631)

Αριθμός φορολογικού μητρώου NCBI	9606
Κελλοσαύρος	CVCL_2235

ΈΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ

Έκφραση αντιγόνου

Αντιγόνο P53, κυτταροκερατίνη-18, ειδικό για τον προστάτη αντιγόνο, όξινη φωσφατάση του προστάτη, πρωτεΐνη Rb

Ιοί

Ξενότροπος ρετροϊός Bxv-1 ποντικού

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

Θρεπτικό μέσο

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L γλυκόζη, w: 2,5 mM L-γλουταμίνη, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM πυρουβικό νάτριο, w: 1,2 g/L NaHCO3 (αριθμός άρθρου Cytion 820400a)

Ατμόσφαιρα επώασης	37°C, 5%CO2, υγροποιημένη ατμόσφαιρα.

Συμπληρώματα

Συμπληρώστε το μέσο με 10% FBS

Αντιδραστήριο αποσύνδεσης	Accutase

Αναπαραγωγή σε υποκαλλιέργεια

Αφαιρέστε το παλιό μέσο από τα προσκολλημένα κύτταρα και πλύντε τα με PBS που δεν περιέχει ασβέστιο και μαγνήσιο. Για φιάλες T25, χρησιμοποιήστε 3-5 ml PBS και για φιάλες T75, χρησιμοποιήστε 5-10 ml. Στη συνέχεια, καλύψτε πλήρως τα κύτταρα με Accutase, χρησιμοποιώντας 1-2 ml για φιάλες T25 και 2,5 ml για φιάλες T75. Αφήστε τα κύτταρα να επωαστούν σε θερμοκρασία δωματίου για 8-10 λεπτά για να αποκολληθούν. Μετά την επώαση, αναμείξτε απαλά τα κύτταρα με 10 ml μέσου για να ανασυσταθούν και, στη συνέχεια, φυγοκεντρίστε στα 300xg για 3 λεπτά. Απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό, ανασυστάστε τα κύτταρα σε φρέσκο μέσο και μεταφέρετέ τα σε νέες φιάλες που περιέχουν ήδη φρέσκο μέσο.

Πυκνότητα σποράς	4-8 x 10^4 κύτταρα/cm^2

Απόψυξη και καλλιέργεια

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Στειρότητα

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.
Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

Μέσο κατάψυξης	Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Όροι αποστολής

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

ΔΩΡΗΤΉΣ

Ηλικία δωρητή	59 χρόνια
Εθνικότητα	Ευρωπαϊκό

ΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Όταν σχεδιάζετε να αποθηκεύσετε ένα κρυοφιαλίδιο σε υγρό άζωτο για μελλοντική απόψυξη, είναι υποχρεωτικό να τηρείτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός είναι απαραίτητα, ενώ απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου ή γυαλιών ασφαλείας κατά τη μεταφορά κατεψυγμένων δειγμάτων προς ή από τη δεξαμενή υγρού αζώτου. Αυτό γίνεται για να μετριαστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανές εκρήξεις κρυοσωλήνων κατά την απομάκρυνση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή αιχμηρών θραυσμάτων.

Εγγύηση

Στην Cytion, υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας.
Εγγυόμαστε ότι τα κύτταρά μας θα είναι βιώσιμα κατά την έναρξη της καλλιέργειας για 60 ημέρες μετά την αποστολή από τις εγκαταστάσεις μας.
Διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή/και στο Φύλλο Προϊόντος
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Δήλωση εγγύησης

Απαιτείται συμφωνία μεταφοράς υλικού	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB