VCaP

300631

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

VCaP-cellinjen (Vertebral-Cancer of the Prostate) är en viktig modell för studier av prostatacancer och härrör från en kotmetastas i en prostatacancer hos människa. Den etablerades för att tillhandahålla en relevant in vitro-modell för forskning om biologin bakom prostatacancer och dess metastatiska process, med särskilt fokus på hormonrefraktära stadier av sjukdomen. VCaP-celler är kända för att uttrycka en hög nivå av prostataspecifikt antigen (PSA) och androgenreceptor (AR), vilket gör dem mycket relevanta för studier av androgenreceptorns signalvägar och resistensmekanismer mot antiandrogenbehandling.
VcaP-celler används också i stor utsträckning i genetiska studier, eftersom de bär på genfusionen TMPRSS2-ERG, en vanlig kromosomtranslokation som förekommer i cirka 50% av fallen av prostatacancer. Denna specifika genetiska förändring är betydelsefull eftersom den tros spela en avgörande roll för utvecklingen av prostatacancer. Cellerna är därför ett utmärkt verktyg för forskning som syftar till att förstå de molekylära grunderna för prostatacancer och för utveckling av nya terapeutiska strategier inriktade på TMPRSS2-ERG och relaterade vägar. VCaP-cellerna uppvisar dessutom en robust tillväxt in vitro och kan bilda tumörer när de xenograferas i immundefekta möss, vilket gör dem till ett användbart system för prekliniska studier av nya cancerläkemedel.
Sammantaget utgör VcaP-cellinjen en viktig resurs för molekylära och farmakologiska studier, vilket bidrar väsentligt till förståelsen av prostatacancerns biologi och utvärderingen av nya terapeutiska medel. Dess egenskaper, inklusive hormonresponsivitet, genfusionsuttryck och metastaserande ursprung, gör den unikt lämplig för avancerad prostatacancerforskning, särskilt inom områden som rör androgenoberoende och metastaserande sjukdomsutveckling.

Vävnad	Prostata
Sjukdom	Prostatacarcinom
Metastaseringsställe	Ben, ryggkota

Synonymer

- VCAP
- Vcap
- Vertebral Cancer of the Prostate

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Man
Tillväxtegenskaper	Följsam
Biosäkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Tumörframkallande	Ja, i SCID-möss
Fördubblingstid	Långsamt växande cellinje, fördubblingstid 5-6 dagar.

IDENTIFIERARE

Källa

VicaP (Cytion katalognummer 300631)

NCBI-skattenummer	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_2235

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Antigenuttryck

P53-antigen, Cytokeratin-18, prostataspecifikt antigen, prostatasyrafosfatas, Rb-protein

Virus

Xenotropiskt retrovirus Bxv-1 från mus

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glukos, w: 2,5 mM L-glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM natriumpyruvat, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820400a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS

Dissociationsmedel	Accutase

Vidareodling

Ta bort det gamla mediet från de adherenta cellerna och tvätta dem med PBS som saknar kalcium och magnesium. Använd 3-5 ml PBS för T25-kolvar och 5-10 ml för T75-kolvar. Täck sedan cellerna helt med Accutase, använd 1-2 ml för T25-kolvar och 2,5 ml för T75-kolvar. Låt cellerna inkubera i rumstemperatur i 8-10 minuter så att de lossnar. Efter inkubationen, blanda cellerna försiktigt med 10 ml medium för att resuspendera dem och centrifugera sedan vid 300xg i 3 minuter. Kassera supernatanten, resuspendera cellerna i färskt medium och överför dem till nya kolvar som redan innehåller färskt medium.

Såtäthet	4–8 x 10^4 celler/cm^2

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	59 år
Etnicitet	Europeiska

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes