Human Mesenchymal Stem Cells, Chorion Villi

300646

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

Menselijke mesenchymale stamcellen (MSC's) afkomstig van chorionvilli vormen een zeer veelzijdige populatie van multipotente stromale cellen die zich kunnen differentiëren tot meerdere cellijnen, waaronder adipocyten, osteoblasten en chondrocyten. Deze cellen worden geïsoleerd uit de chorionvilli, een deel van de placenta dat een cruciale rol speelt in de uitwisseling tussen moeder en foetus. Chorionvilli zijn uniek omdat ze bestaan uit zowel foetaal als maternaal weefsel, waardoor ze een unieke micro-omgeving bieden die bijdraagt aan het robuuste zelfvernieuwings- en differentiatievermogen van de MSC's die uit deze bron worden verkregen. De MSC's uit chorionvilli vertonen een primitiever fenotype dan MSC's uit volwassen weefsels, met vaak een hogere proliferatiesnelheid en een breder differentiatiepotentieel. Deze eigenschappen maken ze bijzonder waardevol voor onderzoek op het gebied van regeneratieve geneeskunde, weefselengineering en ziektemodellering.
Van deze MSC's is in vitro rigoureus aangetoond dat ze differentiëren tot adipocyten, osteoblasten en chondrocyten wanneer ze worden gekweekt in lijnspecifieke differentiatiemedia, wat hun potentieel voor toepassingen in weefselregeneratie en ziektemodellering onderstreept. De unieke oorsprong van deze cellen uit de chorionvilli geeft ze specifieke immunomodulerende eigenschappen, die kunnen verschillen van MSC's afkomstig uit andere bronnen, zoals beenmerg of vetweefsel. Dit onderscheid is cruciaal voor studies die zich richten op immuungerelateerde aandoeningen of de ontwikkeling van allogene celtherapieën.
MSC's worden in vroege passages cryogepreserveerd in een gespecialiseerd cryomedium, waardoor hun levensvatbaarheid en functionaliteit na ontdooien wordt gegarandeerd. Elk cryovial bevat minimaal 1 x 10^6 cellen met een levensvatbaarheid tussen 92% en 95%, zoals bepaald door de Trypan Blue-kleurstofuitsluitingstest. Deze cellen zijn afkomstig van gezonde donoren die geïnformeerde toestemming hebben gegeven, waardoor ethische verzamelpraktijken worden gegarandeerd. Elke batch wordt onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles, waaronder grondige tests voor celidentificatie, zuiverheid, potentie en levensvatbaarheid. Deze maatregelen garanderen dat de gekweekte MSC's van hoge kwaliteit zijn en geschikt zijn voor onderzoekstoepassingen, met uitzondering van therapeutisch of in vivo gebruik.

Weefsel	Chorionvlies

Toepassingen

Medicijntesten, regeneratieve geneeskunde, ziekteonderzoek

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Niet gespecificeerd
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Goed verspreide spilvormige, fibroblast-achtige morfologie gedurende ten minste 5 passages. Minder dan 2% cellen vertonen een spontane myofibroblast-achtige morfologie binnen elke passage.
Celtype	Stamcellen

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

Menselijke Mesenchymale Stamcellen, Chorion Villi (Cytion catalogusnummer 300646)

NCBI-belastingnummer	9606

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Antigeenexpressie

Een uitgebreid panel van markers, waaronder CD73/CD90/CD105 (positief) en CD14/CD34/CD45/HLA-DR (negatief), wordt gebruikt in flowcytometrieanalyse om gekweekte MSCs (P2-P3) te identificeren voorafgaand aan cryopreservatie. Deze markers worden aanbevolen door de ISCT MSC-commissie.

Virussen

De donor is negatief voor HBV (PCR), Treponema pallidum (PCR) en HIV-1/2 (IFA). De cellen zijn negatief voor HBV, HCV, HSV1, HSV2, CMV, EBV, HHV6, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum en Ureaplasma parvum.

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

Alpha MEM, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w/o: Ribonucleosiden, w/o: Deoxyribonucleosiden, w: 1,0 mM Natriumpyruvaat, w: 2,2g/L NaHCO3

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS, 2 ng/mL bFGF

Dissociatiereagens	Trypsine-EDTA

Heruitplanten

Voor routinematige adherente celkweek: Zuig het oude kweekmedium van de adherente cellen af en was ze met PBS om eventueel achtergebleven medium te verwijderen. Voeg na het opzuigen van de PBS het juiste volume trypsine/EDTA-oplossing toe op basis van de grootte van het kweekvat (bijv. 1 ml voor een T25-kolf, 3 ml voor een T75-kolf) en incubeer bij kamertemperatuur of 37 °C totdat de cellen loskomen (5-10 minuten). Controleer de onthechting onder een microscoop en tik zo nodig voorzichtig op het vat om de cellen los te maken. Voeg na het losmaken volledig medium toe om de trypsine/EDTA te inactiveren, resuspendeer de cellen voorzichtig en breng een aliquot van de celsuspensie over in een nieuw kweekvat met vers medium. Plaats het kweekvat in een incubator die is ingesteld op 37°C met 5%CO2 en ververs het medium elke 2-3 dagen.

Zaaidichtheid	1 tot 3 x 10^4 cellen/cm^2
Vloeistofverversing	Eerst vochtverversing na 24 uur, daarna om de 2 tot 3 dagen.

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we 80% FBS + 10% basaalmedium + 10% DMSO om de levensvatbaarheid te behouden, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100) voor superieure cryoprotectie, waarbij ongewenste differentiatie wordt voorkomen terwijl de pluripotentie behouden blijft.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	Informeer bij ons
Etnische afkomst	Kaukasisch

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB