MFC

300652

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

La lignée cellulaire Mouse Forestomach Carcinoma (MFC) est un outil précieux pour la recherche sur le cancer, en particulier pour l'étude des métastases tumorales. Cette lignée cellulaire a été établie in vitro et a fait l'objet de plus de 132 passages en sous-culture. Les cellules MFC se caractérisent par l'absence d'inhibition du contact et présentent une variété de morphologies, y compris des formes rondes, polygonales et fusiformes. Sur le plan ultrastructurel, les cellules MFC présentent d'abondantes microvillosités à leur surface et des filopodes étendus dans le cytoplasme. Les noyaux de ces cellules sont de forme irrégulière avec un rapport noyau-cytoplasme accru. En outre, des desmosomes, des hémidesmosomes et un petit nombre de tonofibrilles sont présents.
La lignée cellulaire MFC a un temps de doublement de la population de 24,7 heures, avec un indice mitotique moyen de 32,9 %, atteignant un maximum de 62 % avec une fourchette modale de 70-76. L'efficacité de l'homotransplantation de ces cellules est de 100 %, ce qui indique leur grande viabilité et leur constance dans les contextes expérimentaux. Les tumeurs induites par les cellules MFC sont morphologiquement similaires au carcinome forestier d'origine dont elles sont dérivées, 81,8 % des tumeurs induites métastasant spontanément dans les poumons. Cette forte propension aux métastases pulmonaires véhiculées par le sang rend la lignée cellulaire MFC particulièrement utile pour étudier les mécanismes de métastases tumorales et pour tester des traitements expérimentaux. La conservation des caractéristiques métastatiques de la tumeur primaire souligne la pertinence de cette lignée cellulaire dans la recherche actuelle sur le cancer.

Tissu	Estomac
Maladie	Carcinome gastrique chez la souris

Applications

Recherche sur le cancer

Synonymes

- Mouse Forestomach Carcinoma

CLASSIFICATION

Organisme	Souris
Propriétés de croissance	Adepte

IDENTIFIANTS

Référence

MFC (numéro de catalogue Cytion 300652)

Numéro d'identification fiscale NCBI	10090
Cellosaurus	CVCL_5J48

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

RPMI 1640, w : 2.0 mM Glutamine stable, w : 2.0 g/L NaHCO3 (numéro d'article Cytion 820700a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10% de FBS

Réactif de dissociation	Accutase

Repiquage

Retirer l'ancien milieu des cellules adhérentes et les laver avec du PBS dépourvu de calcium et de magnésium. Pour les flacons T25, utiliser 3-5 ml de PBS, et pour les flacons T75, 5-10 ml. Ensuite, recouvrir complètement les cellules avec Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laisser les cellules incuber à température ambiante pendant 8-10 minutes pour les détacher. Après incubation, mélanger délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifuger à 300xg pendant 3 minutes. Jeter le surnageant, remettre les cellules en suspension dans du milieu frais et les transférer dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes