# HK-CRISPR-Tpr-mEGFP

300662

## GENERAL INFORMATION

### Description

□□□□□□□□ HK-CRISPR-Tpr-mEGFP □□□□□□□□□

## EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

### Protein expression

□□., mEGFP-□□□□

## HANDLING AND CULTURE

### Culture medium

DMEM, w: 4.5 □□□□/□□□□ □□□□□□, w: 4 □□□□□□□□□□□ □□□-□□□□□□□□, w: 3.7 □□□□/□□□□ NaHCO3, w: 1.0 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820300a)

| | |
|---|---|
| **Incubation atmosphere** | 37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□ |

### Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

| | |
|---|---|
| **Dissociation reagent** | □□□□□□□□ |

### Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PBS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ T25 □□□□□□□ PBS 3-5 □□. □□□□□□□□□□□□□□□ T75 □□□□□□□ 5-10 □□. □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ Accutase □□□□□□□ 1-2 □□. □□□□□□□□□□□ T25 □□□ 2.5 □□. □□□□□□□□□□□ T75□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8-10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**Storage conditions**

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□