U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1

300664

GENERAL INFORMATION

Description

U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1 □一種源自 U2OS 細胞的基因組編輯人類骨肉瘤細胞系，其內源性 SEH1L（SEH1）基因已透過 CRISPR/Cas9 技術進行修改，使其編碼一個同框的 SNAPf 標籤。 SEH1 □ Y-複合體（亦稱為 NUP107-160 複合體）的組成部分，該複合體□核孔複合體（NPC）的核心結構模組，有助於核孔支架的組裝與穩定性。透過將 SNAPf 編碼序列插入內源性基因座，標記後的 SEH1 蛋白質在原生調控機制下表達，既能維持生理性的表達水平，又能將對核孔組成的干擾降至最低。
SNAPf 標籤□ SNAP-tag 的一種經工程改造、反應迅速的變體，可與苯甲基鳥嘌呤偶聯的底物形成共價鍵，從而實現對活細胞或固定細胞進行選擇性且穩定的螢光標記。在 U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1 細胞中，該融合蛋白以點狀模式定位於核膜，這正 □核孔複合體（NPC）分佈的特徵。由於標記□在內源性蛋白質水平上進行的，因此該系統非常適合用於定量螢光顯微鏡、超解析度成像以及單粒子追蹤分析，以剖析核孔複合體的組織結構與化學計量關係。 U2OS 細胞扁平的形態和大核進一步促進了核膜結構的高解析度可視化。
SEH1 參與 NPC 的生物合成，並被認為與有絲分裂期間的動點相關過程有關。因此，該細胞系為研究細胞週期依賴性的核孔複合體（NPC）組裝與解聚、Y-複合體在孔架內的空間組織，以及 SEH1 在核膜與有絲分裂動點上的潛在雙重作用，提供了一個穩健的平台。 U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1 使研究人員能夠在符合生理條件的表達環境下，對核孔結構與動態進行機制研究。

Tissue	骨頭
Disease	骨肉瘤
Metastatic site	原發性腫瘤部位（骨）

Applications

Y-複合體／NUP107-160 複合體的生物學；SEH1 在核孔複合體（NPC）支架組裝中的作用；著絲點相關的 NPC 組成成分；NPC 的化學計量比；SNAP 脈衝-追蹤標記法；超解析度顯微鏡；NPC 的生物合成；有絲分裂期間 NPC 的解聚與重組

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
GMO status	GMO-S1

GMO status details

GMO-S1: This human osteosarcoma cell line (U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1) contains a CRISPR-mediated SNAPf-SEH1 fusion that allows selective labeling of the SEH1 nucleoporin. The modification is stably present. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	上皮樣
Cell type	上皮細胞（骨肉瘤）
Doubling time	約 24 至 36 小時

IDENTIFIERS

Citation

U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1（Cytion 型號 300664）

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	Not assigned (CRISPR-modified U2OS derivative; parental U2OS CVCL_0042)
Depositor	艾倫伯格實驗室（EMBL）

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

SEH1 ′ SNAPf-tag

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

麥考伊 5a 培養基，含：3.0 g/L 葡萄糖，含：穩定型谷氨酰胺，含：2.0 mM 丙酮酸鈉，含：2.2 g/L $NaHCO_3$（Cytion 產品編號 820200a）

Incubation atmosphere	37°C，5% CO_2，加濕環境。

Supplements

在培養基中加入 10% FBS ′ 3.0 g/L 葡萄糖、穩定型谷氨醯胺、2.0 mM 丙酮酸鈉、2.2 g/L $NaHCO_3$ 以及 1% NEAA

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

從貼壁細胞中移除舊培養基，並用不含鈣和鎂的 PBS洗滌細胞。T25培養瓶使用3-5毫升PBS，T75培養瓶則使用5-10毫升。 接著，用 Accutase 完全覆蓋細胞，T25 培養瓶使用 1–2 毫升，T75 培養瓶則使用 2.5 毫升。將細胞於室溫下孵育 8–10 分鐘，使其脫附。 孵育後，將細胞與 10 毫升培養基輕柔混合以使其重新懸浮，然後以 300xg 離心 3 分鐘。棄去上清液，將細胞重新懸浮於新鮮培養基中，並轉移至已預先加入新鮮培養基的新培養瓶中。

Split ratio	1 至 3
Seeding density	1 至 3 × 10^4 個細胞/cm^2
Fluid renewal	每週 2 至 3 次

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

透過基於 PCR 的檢測及基於發光原理的支原體檢測方法，排除支原體污染的可能性。
為確保無細菌、真菌或酵母菌污染，每日均會對細胞培養物進行目視檢查。

Freeze medium	作為冷凍保存培養基，我們使用完全生長培養基（含 FBS）+ 10% DMSO 以確保解凍後的存活率，或使用 CM-1（Cytion 型號 800100），該培養基含有經優化的滲透保護劑和代謝穩定劑，可提升細胞恢復率並減輕冷凍誘導的壓力。

Storage conditions
若需長期保存，請將試管置於溫度約為 −150 至 −196 °C 的氣相液氮中。僅在轉移至液氮之前，可將試管暫時存放於 −80 °C 環境中，作為短期過渡步驟。

Shipping conditions
冷凍保存的細胞系會以乾冰冷藏，並裝於經驗證的隔熱包裝中，包裝內含有足夠的冷媒，以確保在運輸過程中溫度維持在約 −78 °C。收到貨物後，請立即檢查容器，並盡快將試管轉移至適當的儲存場所。

DONOR

Donor age 15年

Ethnicity 高加索人

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions
若計劃將低溫試管存放在液態氮中以供日後解凍，必須嚴格遵守相關安全措施。 必須穿戴適當的防護手套和防護服，且在將冷凍樣本移入或移出液氮罐時，必須佩戴口罩或安全護目鏡。此舉旨在降低因取出時冷凍試管可能發生爆炸而導致受傷的風險，此類爆炸可能造成尖銳碎片飛濺。

Warranty
在 Cytion，我們對產品的品質與存活率提供保障。
我們保證，自本公司設施出貨後
60 天內，我們的細胞在培養開始時仍具存活能力。
我們保證所有材料均符合
分析證明書及／或產品說明書中所載的規格。
詳情請參閱我們的
《保固聲明》。

Third-party agreements apply Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

3 / 3