HK EGFP-Kleisin-beta

300674

GENERAL INFORMATION

Description

HK EGFP-Kleisin-beta□□□□Hela Kyoto□□□□

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

EGFP-Kleisin-β□□□/□□□ 1...589 / Pcmv, 619...645 / Flag-tag, 661...1368 / GFP, 1393...3206 / Kleisin Beta, 4474...5268 KanR/NeoR

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM□w□4.5 □/□□□□□w□4 □□□ L-□□□□□w□3.7 □/□ NaHCO3□w□1.0 □□□□□□□□Cytion □□ 820300a□□

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□

Supplements

□□□□□□□ 10% FBS

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PBS □□□T25 □□□ 3-5 □□ PBS□T75 □□□ 5-10 □□□□□□ Accutase □□□□□□□T25 □□□ 1-2 □□□T75 □□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□ 8-10 □□□□□□□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 300xg □□ 3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DONOR

Donor age	30□
Ethnicity	□□□□□□

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

□□□□□