Menselijke subcutane pre-adipocyten

300697

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

Subcutane pre-adipocyten van de mens zijn primaire pre-adipocyten die zijn geïsoleerd uit subcutaan vetweefsel van de mens. Ze kunnen worden vermeerderd en gedifferentieerd tot volgroeide adipocyten, waardoor ze dienen als model voor onderzoek naar adipogenese, metabolisme, obesitas en diabetes.

Weefsel	Vetweefsel (subcutaan)
Ziekte	Normaal

Toepassingen

Onderzoek naar adipogenese en differentiatie; onderzoek naar obesitas, stofwisseling en diabetes

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Fibroblastachtig (preadipocyt)
Celtype	Preadipocyt
Verdubbelingstijd	Ongeveer 48-72 uur

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

Subcutane pre-adipocyten van de mens (Cytion-catalogusnummer 300697)

NCBI-belastingnummer	9606

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

Groeimedium voor preadipocyten

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Groeisupplementen; serum (FBS) volgens het medium

Dissociatiereagens	Trypsine-EDTA of Accutase

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Heruitplanten

Bij een confluentie van 70-80% spoel je de cellen af met PBS, maak je ze los met trypsine-EDTA of Accutase, neutraliseer je ze, centrifugeer je ze 3 minuten bij 300xg en zaai je ze opnieuw uit in vers medium.

Splitsingsverhouding	1:2 tot 1:3
Zaaidichtheid	5 × 10^3 cellen/cm^2
Vloeistofverversing	Om de 2-3 dagen

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 200 x g for 5 minutes, carefully discard the supernatant containing freezing medium.
Follow the procedure described under Post-Thaw Recovery

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes