Human Gingival Fibroblasts (hGF)

300703

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

Humane gingivale fibroblaster (hGF) er primære celler, der stammer fra bindevævet i gingiva eller tandkødet i mundhulen. Disse fibroblaster spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af tandkødsvævets strukturelle integritet ved at producere ekstracellulære matrixkomponenter, herunder kollagen, elastin og glykosaminoglykaner. Deres evne til at sprede sig og migrere er afgørende for sårheling, vævsreparation og reaktionen på parodontale sygdomme. Ud over deres strukturelle roller er hGF involveret i inflammatoriske reaktioner i gingiva, hvor de interagerer med forskellige immunceller og medierer frigivelsen af cytokiner og vækstfaktorer. Det gør dem til en vigtig cellulær model for studier af oral sundhed, parodontal sygdom og vævsregenerering.
hGF-celler bruges i vid udstrækning i forskning med fokus på oral biologi, især til at forstå patofysiologien ved parodontale sygdomme, hvor samspillet mellem fibroblaster og patogene bakterier som *Porphyromonas gingivalis* er af stor interesse. Disse celler bruges også inden for vævsteknik og regenerativ medicin, især til at udvikle behandlinger af tandkøds- og parodontale defekter. Deres reaktion på forskellige biomaterialer, vækstfaktorer og ekstracellulære matrixkomponenter undersøges ofte for at optimere betingelserne for vævsreparation og -regenerering inden for oral kirurgi og tandimplantater.

Væv	Gingiva

Anvendelser

Vævsregenerering, undersøgelser af sårheling

Synonymer

- HGF
- HFIB-G
- Human fibroblasts
- gingiva
- provitro 1210412

DONOR

Donorens alder	Lot-specific (see CoA)
Etnisk tilhørsforhold	Lot-specific (see CoA)

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Partispecifik
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Spindle-shaped (fibroblast-like)
Celletype	Fibroblast
Tumorfremkaldende	No

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L Glucose, w: 2,5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM Sodium pyruvate, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820400a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS, 10 ng/mL bFGF, 10 mikrogram/L Insulin

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Såtæthed	More than 4,000 cells/cm²
Væskeudskiftning	24 hours after seeding, then every 48 to 72 hours
Genopretning efter optøning	Post-thaw viability ≥ 70 % viable cells. More than 80 % confluence within the expected recovery period.

Optøning og dyrkning

Thaw the cryovial quickly in a 37 °C water bath, swirling gently. Just before the last ice has melted, move the vial to a laminar flow hood and decontaminate its outer surface.
Transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube, add 10 ml of Fibroblast Growth Medium and centrifuge at 250 × g for 5 minutes.
Remove the supernatant and resuspend the cell pellet in 10 ml of Fibroblast Growth Medium. Check cell number and viability.
Divide the suspension between two 25 cm² culture flasks (5 ml each). Using two flasks reduces the risk of losing all cells if a passage fails.
Incubate at 37 °C, 5 % CO_2 and saturated humidity, with the screw caps opened by half a turn for gas exchange.
Change the medium after 24 hours to remove unattached cells, then every 48 to 72 hours, using pre-warmed medium only.
Subculture the cells at about 75 % confluence. Denser cultures undergo irreversible contact inhibition and stop proliferating. Use the subculture reagents recommended on the certificate of analysis.
Recommended seeding density: more than 4,000 cells/cm².

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi 90 % FBS + 10 % DMSO for at opretholde levedygtigheden eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende midler og metaboliske stabilisatorer for at øge gendannelsen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

Human Gingival Fibroblasts (hGF) (Cytion katalognummer 300703)

NCBI-skattenummer	9606

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB