Human Gingival Fibroblasts (hGF)

300703

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

Human Gingival Fibroblasts (hGF) zijn primaire cellen afkomstig van het bindweefsel van de gingiva, of tandvleesweefsel, in de mondholte. Deze fibroblasten spelen een cruciale rol in het behoud van de structurele integriteit van het tandvleesweefsel door extracellulaire matrixcomponenten te produceren, waaronder collageen, elastine en glycosaminoglycanen. Hun vermogen om te prolifereren en te migreren is essentieel voor wondgenezing, weefselherstel en de reactie op parodontale aandoeningen. Naast hun structurele rol zijn hGF betrokken bij ontstekingsreacties in de gingiva, door interactie met verschillende immuuncellen en het mediëren van het vrijkomen van cytokinen en groeifactoren. Hierdoor zijn ze een belangrijk cellulair model voor het bestuderen van mondgezondheid, parodontale aandoeningen en weefselregeneratie.
hGF cellen worden op grote schaal gebruikt in onderzoek gericht op orale biologie, met name bij het begrijpen van de pathofysiologie van tandvleesaandoeningen, waarbij de interactie tussen fibroblasten en pathogene bacteriën zoals *Porphyromonas gingivalis* van groot belang is. Deze cellen worden ook gebruikt in tissue engineering en regeneratieve geneeskunde, met name bij de ontwikkeling van therapieën voor gingivale en parodontale defecten. Hun reactie op verschillende biomaterialen, groeifactoren en extracellulaire matrixcomponenten wordt vaak bestudeerd om de omstandigheden voor weefselherstel en regeneratie in de mondchirurgie en tandheelkundige implantaten te optimaliseren.

Weefsel	Tandvlees

Toepassingen

Weefselregeneratie, Onderzoek naar wondgenezing

Synoniemen

- HGF
- HFIB-G
- Human fibroblasts
- gingiva
- provitro 1210412

DONATEUR

Leeftijd van de donor	Lot-specific (see CoA)
Etnische afkomst	Lot-specific (see CoA)

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Lot-specifiek
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Spindle-shaped (fibroblast-like)
Celtype	Fibroblast

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tumorverwekkend	No

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L Glucose, w: 2,5 mM L-Glutamine, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM Natriumpyruvaat, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820400a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS, 10 ng/mL bFGF, 10 microgram/L insuline

Dissociatiereagens	Accutase

Heruitplanten

Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugeren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.

Zaaidichtheid	More than 4,000 cells/cm²
Vloeistofverversing	24 hours after seeding, then every 48 to 72 hours
Herstel na ontdooiing	Post-thaw viability ≥ 70 % viable cells. More than 80 % confluence within the expected recovery period.

Ontdooien en kweken

Thaw the cryovial quickly in a 37 °C water bath, swirling gently. Just before the last ice has melted, move the vial to a laminar flow hood and decontaminate its outer surface.
Transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube, add 10 ml of Fibroblast Growth Medium and centrifuge at 250 × g for 5 minutes.
Remove the supernatant and resuspend the cell pellet in 10 ml of Fibroblast Growth Medium. Check cell number and viability.
Divide the suspension between two 25 cm² culture flasks (5 ml each). Using two flasks reduces the risk of losing all cells if a passage fails.
Incubate at 37 °C, 5 % CO_2 and saturated humidity, with the screw caps opened by half a turn for gas exchange.
Change the medium after 24 hours to remove unattached cells, then every 48 to 72 hours, using pre-warmed medium only.
Subculture the cells at about 75 % confluence. Denser cultures undergo irreversible contact inhibition and stop proliferating. Use the subculture reagents recommended on the certificate of analysis.
Recommended seeding density: more than 4,000 cells/cm².

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we 90% FBS + 10% DMSO om de levensvatbaarheid te behouden, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en cryogeïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

Humane gingivale fibroblasten (hGF) (Cytion catalogusnummer 300703)

NCBI-belastingnummer	9606

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes