Human Gingival Fibroblasts (hGF)

300703

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Фібробласти ясен людини (hGF) - це первинні клітини, що походять зі сполучної тканини ясен, або ясенної тканини, в ротовій порожнині. Ці фібробласти відіграють важливу роль у підтримці структурної цілісності ясенної тканини, виробляючи компоненти позаклітинного матриксу, включаючи колаген, еластин і глікозаміноглікани. Їх здатність до проліферації та міграції має важливе значення для загоєння ран, відновлення тканин і реакції на пародонтоз. Окрім своєї структурної ролі, hGF беруть участь у запальних реакціях в ясна, взаємодіючи з різними імунними клітинами та опосередковуючи вивільнення цитокінів і факторів росту. Це робить їх ключовою клітинною моделлю для вивчення здоров'я порожнини рота, пародонтозу та регенерації тканин.
клітини hGF широко використовуються в дослідженнях, спрямованих на біологію порожнини рота, зокрема, для розуміння патофізіології захворювань пародонту, де взаємодія між фібробластами і патогенними бактеріями, такими як *Porphyromonas gingivalis*, представляє значний інтерес. Ці клітини також використовуються в тканинній інженерії та регенеративній медицині, особливо при розробці методів лікування дефектів ясен і пародонту. Їх реакція на різні біоматеріали, фактори росту та компоненти позаклітинного матриксу часто вивчається для оптимізації умов відновлення та регенерації тканин в хірургічній стоматології та при імплантації зубних імплантатів.

Тканина	Ясна

Застосування

Регенерація тканин, дослідження загоєння ран

Синоніми

- HGF
- HFIB-G
- Human fibroblasts
- gingiva
- provitro 1210412

ДОНОР

Вік донора	Lot-specific (see CoA)
Етнічна приналежність	Lot-specific (see CoA)

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Залежно від партії
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Spindle-shaped (fibroblast-like)
Тип клітини	Фібробласт
Пухлиноутворювальний	No

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 г/л Глюкоза, w: 2,5 мМ L-глутамін, w: 15 мМ HEPES, w: 0,5 мМ Піруват натрію, w: 1,2 г/л NaHCO3 (цит. номер 820400a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS, 10 нг/мл bFGF, 10 мкг/л інсуліну

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Щільність висіву	More than 4,000 cells/cm²
Оновлення рідини	24 hours after seeding, then every 48 to 72 hours
Відновлення після відлиги	Post-thaw viability ≥ 70 % viable cells. More than 80 % confluence within the expected recovery period.

Розморожування та культивування

Thaw the cryovial quickly in a 37 °C water bath, swirling gently. Just before the last ice has melted, move the vial to a laminar flow hood and decontaminate its outer surface.
Transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube, add 10 ml of Fibroblast Growth Medium and centrifuge at 250 × g for 5 minutes.
Remove the supernatant and resuspend the cell pellet in 10 ml of Fibroblast Growth Medium. Check cell number and viability.
Divide the suspension between two 25 cm² culture flasks (5 ml each). Using two flasks reduces the risk of losing all cells if a passage fails.
Incubate at 37 °C, 5 % CO_2 and saturated humidity, with the screw caps opened by half a turn for gas exchange.
Change the medium after 24 hours to remove unattached cells, then every 48 to 72 hours, using pre-warmed medium only.
Subculture the cells at about 75 % confluence. Denser cultures undergo irreversible contact inhibition and stop proliferating. Use the subculture reagents recommended on the certificate of analysis.
Recommended seeding density: more than 4,000 cells/cm².

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо 90% FBS + 10% ДМСО для підтримки життєздатності або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

Фібробласти ясен людини (hGF) (номер за каталогом цитології 300703)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes