HROC348

300719

OBECNÉ INFORMACE

Popis

HROC348 je buněčná linie lidského kolorektálního karcinomu odvozená z primárního nádoru resekovaného u dospělého muže s diagnózou karcinomu sigmoidea. Nádor byl klasifikován jako středně pokročilý adenokarcinom (T3, G3, N2), což svědčí o významné lokální invazi a postižení lymfatických uzlin, což odpovídá agresivnímu chování nádoru. Karcinom vznikl v sigmoideu, což je časté anatomické místo pro sporadický kolorektální karcinom, a vykazoval mikrosatelitní stabilitu (MSS), což jej řadí spíše k podtypu chromozomální nestability (CIN) než k hypermutované třídě kolorektálních nádorů s vysokým MSI.
Molekulární profilování HROC348 vykazuje divoký typ pro KRAS i BRAF, což naznačuje nepřítomnost běžných aktivačních mutací v těchto genech, které se často podílejí na progresi kolorektálního karcinomu a rezistenci na léčbu. Díky tomuto molekulárnímu pozadí je HROC348 zvláště vhodný pro studie zaměřené na nemutovanou signalizaci RAS/RAF a její důsledky pro růst nádoru, léčebnou odpověď a mechanismy rezistence. Tato buněčná linie nevykazuje fenotyp CpG ostrovního metylátoru (CIMP), což dále podporuje její zařazení do podskupiny konvenčního (nehypermutovaného) kolorektálního karcinomu.
Klinicky byl nádor pozitivní na metastázy v lymfatických uzlinách (LN_pos = 2), ale vzdálené metastázy (M) byly zaznamenány pouze jednou a nebylo zaznamenáno žádné pravostranné postižení tlustého střeva, což odpovídá levostrannému profilu kolorektálního karcinomu. Tyto vlastnosti spolu se stavem MSS a molekulárními markery staví HROC348 do pozice reprezentativního modelu pro studium levostranného, KRAS/BRAF divokého typu, mikrosatelitově stabilního kolorektálního adenokarcinomu. Nabízí také translační hodnotu pro preklinické testování cílených terapií a imunomodulačních látek u nádorů s MSS, které jsou obvykle méně citlivé na blokádu imunitních kontrolních bodů.

Tkáň	Sigmoidní tračník
Nemoc	Karcinom
Místo metastázy	Není uvedeno (primární adenokarcinom sigmoidního tračníku; v době odběru vzorku nebyly potvrzeny žádné vzdálené metastázy)

Aplikace

Výzkum kolorektálního karcinomu; biologie kolorektálního karcinomu typu MSS s divokými typy genů KRAS/BRAF; modelování levostranného kolorektálního karcinomu; citlivost na léčiva u nádorů s nemutovanými geny RAS/RAF; studie biobanky HROC Linnebacher; hodnocení imunoterapie kolorektálního karcinomu; preklinická onkologie

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Muž
Růstové vlastnosti	Přívrženec
Stav GMO	Bez GMO

Podrobnosti o statusu GMO

No genetic modification; wildtype patient-derived CRC cell line from the HROC Linnebacher biobank. KRAS wild-type, BRAF wild-type, MSS, CIMP-negative.

Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Epitelu podobné
Typ buňky	Epitelové buňky

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Stav MSI	MSS

IDENTIFIKÁTORY

Citace

HROC348 (katalogové číslo Cytion 300719)

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	Not assigned

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/l glukózy, w: 2,5 mM L-Glutaminu, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM pyruvátu sodného, w: 1,2 g/l NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820400a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 10% FBS

Disociační činidlo	Accutase

Subkultivace

Odstraňte staré médium z adherovaných buněk a promyjte je PBS bez vápníku a hořčíku. Pro baňky T25 použijte 3-5 ml PBS a pro baňky T75 5-10 ml. Poté buňky zcela zakryjte přípravkem Accutase, přičemž použijte 1-2 ml pro baňky T25 a 2,5 ml pro baňky T75. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 8-10 minut, aby se oddělily. Po inkubaci jemně promíchejte buňky s 10 ml média, aby byly znovu suspendovány, a poté je odstřeďte při 300xg po dobu 3 minut. Supernatant vyhoďte, buňky znovu rozpusťte v čerstvém médiu a přeneste je do nových baněk, které již obsahují čerstvé médium.

Obnova tekutin	2 až 3krát týdně

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	77 let
Etnická příslušnost	Kavkazský

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Platí smlouvy s třetími stranami	Yes