HROBMC01

300800

GENERAL INFORMATION

Description

□□□ 2006 □□□ Michael Linnebacher □□□□

Mutational profile

P53 □□□APC □□□K-RasG12VA□N-Ras □□□□H-Ras □□□□PIK3CA □□□□B-Raf □□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM□Ham's F12□1:1□□□□□□3.1 g/L □□□□□□□□2.5 mM L-□□□□□□□□□□15 mM HEPES□ w: 0.5 mM □□□□□w: 1.2 g/L $NaHCO_3$ □Cytion □□□□ 820400a□

Incubation atmosphere	37°C□5% CO_2□□□□□□

Supplements

□□□□□□□ 10% □□□□□□FBS□

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PBS□□□□□T25□□□□□3-5□□PBS□T75□□□□□□5-10□□□ □□□□ Accutase □□□□□□□T25 □□□□□ 1–2 □□□T75 □□□□□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□ 8–10 □□□□□□□□ □□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 300xg □□ 3 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DONOR

Donor age	60□
Ethnicity	□□□□

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

□□□