B-LCL-HROC69

300864

GENEL BILGILER

Açıklama

B-LCL-HROC69, HROC69 olarak adlandırılan birincil kolorektal karsinom örneğinden izole edilen tümör infiltre edici B hücrelerinden (TiBc) oluşturulan Epstein-Barr virüsü (EBV) ile ölümsüzleştirilmiş bir B lenfoblastoid hücre hattıdır. Ana tümör, konvansiyonel sporadik tipte ve ileri evre sağ taraf kolorektal karsinomlu yetişkin bir erkek hastadan kaynaklanmıştır. B hücreleri, taze rezeke edilmiş tümör dokusundan izole edilmiş ve T ve NK hücrelerinin büyümesini bastırmak için siklosporin A varlığında EBV üreten B95/8 marmoset hücre hattının süpernatantı kullanılarak ex vivo ölümsüzleştirilmiştir. EBV ile dönüştürülmüş B hücresi klonlarının büyümesi tipik olarak birkaç hafta içinde gerçekleşti ve klonalite, BIOMED-2 çoklu PCR protokolleri kullanılarak immünoglobulin ağır ve hafif zincir gen yeniden düzenleme analizi ile doğrulandı. B-LCL-HROC69, uzun süreli kültür süpernatantlarının izotip spesifik ELISA ile belirlenmesi sonucunda immünoglobulin A (IgA) salgılar. Paralel olarak oluşturulan birkaç IgG üreten TiBc hattının aksine, HROC69'dan elde edilen IgA, ilk fonksiyonel tarama testlerinde tümör hücresi bağlanması açısından daha fazla karakterize edilmedi. Önemli olarak, ekzojen EBV yokluğunda B hücresi kültürlerinde spontan büyüme meydana gelmemiştir, bu da ölümsüzleşmenin in vivo latent EBV enfeksiyonunun bir sonucu değil, in vitro bir olay olduğunu göstermektedir. B-LCL-HROC69 bu nedenle, kolorektal karsinom mikroçevresi içinde humoral bağışıklık tepkilerini araştırmak ve lokal olarak genişlemiş B hücresi klonları tarafından tanınan tümörle ilişkili antijenleri potansiyel olarak tanımlamak için uygun, monoklonal, antijen deneyimli, tümöre sızan B hücresi modelini temsil etmektedir.

Doku	Periferik kan
Hastalık	Karsinom

Eş anlamlılar

- B-LCL CO69
- Bc HROC69
- TiBcHROC69

SINIFLANDIRMA

Canlı	İnsan
Cinsiyet	Erkek
Büyüme özellikleri	Askıya alma
Biyogüvenlik seviyesi	2

ÖZELLIKLER

Morfoloji	Yuvarlak hücreler
Hücre türü	B lenfoblast

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

B-LCL-HROC69 (Cytion katalog numarası 300864)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	9606
Cellosaurus	CVCL_YD53

İFADE VE DUYARLILIK

Yüzey antijenleri

CD19

Virüsler

Transformant: EBV

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

RPMI 1640, w: 2.0 mM stabil Glutamin, w: 2.0 g/L NaHCO3 (Cytion makale numarası 820700a)

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %10 ısıyla inaktive edilmiş FBS ile destekleyin

Alt kültür oluşturma

Şişedeki hücre süspansiyonunu pipetle yukarı aşağı hareket ettirerek nazikçe homojenleştirin, ardından ml başına hücre yoğunluğunu belirlemek için temsili bir numune alın. Süspansiyonu, 1 x 10^5 hücre/ml hücre konsantrasyonuna ulaşmak için taze kültür ortamı ile seyreltin ve ayarlanan süspansiyonu daha fazla kültürleme için yeni şişelere bölün.

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

BAĞIŞÇI

Bağışçının yaşı	62 yıl

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Etnik köken	Kafkas

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Üçüncü taraf sözleşmeleri geçerlidir	Yes