HROG17 T1 M1

300875

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

HROG17 T1 M1 — це первинна клітинна лінія мультиформної гліобластоми (GBM) людини, створена з зразка пухлини, видаленої у дорослого пацієнта з діагнозом гліобластома IV ступеня за класифікацією ВООЗ. Позначення «T1» вказує на те, що зразок був отриманий під час першої хірургічної операції, а «M1» позначає відповідну in vitro модель, отриману з цієї пухлини. Клітинна лінія була створена в рамках платформи HROG (Hansestadt Rostock Glioma), яка зосереджується на створенні культур гліоми з наднизьким пасажем, що зберігають молекулярні та фенотипічні характеристики, специфічні для пацієнта.
HROG17 T1 M1 росте в стандартних умовах культивування і має фібробластоподібну морфологію, типову для первинних культур GBM. Імунофенотипна характеристика ліній, отриманих з HROG, демонструє експресію маркерів, пов'язаних з гліальним і нервовим походженням, таких як гліальний фібрилярний кислий білок (GFAP), нестин і віментин, що відповідає походженню високодиференційованої астроцитарної пухлини. Молекулярне профілювання в колекції HROG включає оцінку клінічно значущих параметрів, таких як метилювання промотора MGMT, статус ампліфікації EGFR та мутаційний аналіз ключових генів, включаючи TP53, IDH1/2, KRAS та BRAF, що підтверджує збереження специфічних для пухлини геномних змін у культурі.
HROG17 T1 M1 використовувався для оцінки чутливості до стандартних засобів лікування гліобластоми, включаючи алкілуючі хіміотерапевтичні препарати та додаткові цільові сполуки. Порівняльний аналіз моделей HROG показує, що культури з низьким пасажем зберігають стабільну морфологію, кінетику росту та профілі реакції на ліки протягом перших пасажів. Як модель гліобластоми з низьким пасажем, отримана від пацієнта, HROG17 T1 M1 забезпечує клінічно релевантну платформу in vitro для вивчення біології пухлин, терапевтичної реакції та міжпухлинної гетерогенності у високодиференційованих гліомах.

Тканина	Мозок
Хвороба	Гліобластома

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Чоловік
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

HROG17 T1 M1 (номер за каталогом Cytion 300875)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_B7FQ

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 г/л Глюкоза, w: 2,5 мМ L-глутамін, w: 15 мМ HEPES, w: 0,5 мМ Піруват натрію, w: 1,2 г/л NaHCO3 (цит. номер 820400a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS

Реагент для дисоціації	TrypLE Express, 37°C, 10 хв,

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо 50% базальне середовище + 40% FBS + 10% ДМСО або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для покращення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	70 років
Етнічна приналежність	Кавказець

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Діють угоди з третіми сторонами	Yes